

- 140 104A 小青竜湯加杏仁石膏(小青竜湯合麻杏甘石湯)
 〔成分・分量〕 麻黄2-4、芍薬2-3、乾姜2-3、甘草2-3、桂皮2-3、細辛2-3、五味子1.5-3、半夏3-6、杏仁4、石膏5-10
 〔用法・用量〕 湯
 〔効能・効果〕 体力中等度で、せきが出て、のどの渴きがあるものの次の諸症：
 気管支ぜんそく、小児ぜんそく、せき
- 141 104B 小青竜湯加石膏
 〔成分・分量〕 麻黄3、芍薬3、乾姜2-3、甘草2-3、桂皮3、細辛2-3、五味子2-3、半夏6-8、石膏2-5
 〔用法・用量〕 湯
 〔効能・効果〕 体力中等度で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出て、のどの渴きがあるものの次の諸症：
 気管支炎、気管支ぜんそく、鼻炎、アレルギー性鼻炎、むくみ、感冒
- 143 105 椒梅湯
 〔成分・分量〕 烏梅2、山椒2、檳榔子2、枳実2、木香2、縮砂2、香附子2、桂皮2、川楝子2、厚朴2、甘草2、乾姜2
 〔用法・用量〕 湯
 〔効能・効果〕 回虫の駆除
 《備考》 注)体力に関わらず、使用できる。
 【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】
- 144 106 小半夏加茯苓湯
 〔成分・分量〕 半夏5-8、ヒネショウガ5-8(生姜を用いる場合1.5-3)、茯苓3-8
 〔用法・用量〕 湯
 〔効能・効果〕 体力に関わらず使用でき、悪心があり、ときに嘔吐するものの次の諸症：
 つわり、嘔吐、悪心、胃炎
- 145 107 消風散
 〔成分・分量〕 当帰3、知母1-2、地黄3、胡麻1-1.5、石膏3-5、蝉退1-1.5、防風2、苦参1-1.5、蒼朮2-3(白朮も可)、荊芥1-2、木通2-5、甘草1-1.5、牛蒡子2
 〔用法・用量〕 湯
 〔効能・効果〕 体力中等度以上の人の皮膚疾患で、かゆみが強くて分泌物が多く、ときに局所の熱感があるものの次の諸症：
 湿疹・皮膚炎、じんましん、水虫、あせも

- 146 108 升麻葛根湯
〔成分・分量〕 葛根5-6、升麻1-3、生姜0.5-1(ヒネシヨウガを使用する場合2-3)、芍薬3、甘草1.5-3
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度で、頭痛、発熱、悪寒などがあるものの次の諸症：
感冒の初期、湿疹・皮膚炎
- 147 109 逍遙散(八味逍遙散)
〔成分・分量〕 当帰3-4.5、芍薬3-4.5、柴胡3-4.5、白朮3-4.5(蒼朮も可)、茯苓3-4.5、甘草1.5-3、生姜0.5-1、薄荷葉1-2.1
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、肩がこり、疲れやすく精神不安などの精神神経症状、ときに便秘の傾向のあるものの次の諸症：
冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症^{注)}、不眠症、神経症
《備考》
注)血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。
【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】
- 35 109A 加味逍遙散
〔成分・分量〕 当帰3、芍薬3、白朮3(蒼朮も可)、茯苓3、柴胡3、牡丹皮2、山梔子2、甘草1.5-2、生姜1、薄荷葉1
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、のぼせ感があり、肩がこり、疲れやすく、精神不安やいらだちなどの精神神経症状、ときに便秘の傾向のあるものの次の諸症：
冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症^{注)}、不眠症
《備考》
注)血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。
【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

- 36 109B 加味逍遙散加川芎地黄(加味逍遙散合四物湯)
 [成分・分量] 当帰3-4、芍薬3-4、白朮3(蒼朮も可)、茯苓3、柴胡3、川芎3-4、地黄3-4、甘草1.5-2、牡丹皮2、山梔子2、生姜1-2、薄荷葉1
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度以下で、皮膚があれてかさかさし、ときに色つやが悪く、胃腸障害はなく、肩がこり、疲れやすく精神不安やいらだちなどの精神神経症状、ときにかゆみ、便秘の傾向のあるものの次の諸症：
 湿疹・皮膚炎、しみ、冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症^{注)}
 《備考》 注)血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。
 【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。]
- 149 110 辛夷清肺湯
 [成分・分量] 辛夷2-3、知母3、百合3、黄芩3、山梔子1.5-3、麦門冬5-6、石膏5-6、升麻1-1.5、枇杷葉1-3
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度以上で、濃い鼻汁が出て、ときに熱感を伴うものの次の諸症：
 鼻づまり、慢性鼻炎、蓄膿症(副鼻腔炎)
- 150 111 秦艽羌活湯
 [成分・分量] 秦艽3、羌活5、黄耆3、防風2、升麻1.5、甘草1.5、麻黄1.5、柴胡1.5、藁本0.5、細辛0.5、紅花0.5
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度なものの次の症状：
 かゆみのある痔疾
- 151 112 秦艽防風湯
 [成分・分量] 秦艽2、沢瀉2、陳皮2、柴胡2、防風2、当帰3、蒼朮3、甘草1、黄柏1、升麻1、大黄1、桃仁3、紅花1
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度で、便秘傾向があるものの次の症状：
 痔核で排便痛のあるもの
- 113 神仙太乙膏
 [成分・分量] 当帰1、桂皮1、大黄1、芍薬1、地黄1、玄参1、白芷1、ゴマ油30-48、黄蠟12-48
 [用法・用量] 外用
 [効能・効果] 切り傷、かゆみ、虫刺され、軽いとこずれ、やけど

- 152 114 参蘇飲
〔成分・分量〕 蘇葉1-3、枳実1-3、桔梗2-3、陳皮2-3、葛根2-6、前胡2-6、半夏3、茯苓3、人参1.5-2、大棗1.5-2、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合1.5-3、生姜の代わりに乾姜も可)、木香1-1.5、甘草1-2(木香はなくても可)
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力虚弱で、胃腸が弱いものの次の諸症:
感冒、せき
- 153 115 神秘湯
〔成分・分量〕 麻黄3-5、杏仁4、厚朴3、陳皮2-3、甘草2、柴胡2-4、蘇葉1.5-3
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度で、せき、喘鳴、息苦しさがあり、たんが少ないものの次の諸症:
小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎
- 154 116 真武湯
〔成分・分量〕 茯苓3-5、芍薬3-3.6、白朮2-3(蒼朮も可)、生姜1(ヒネショウガを使用する場合2-3.6)、加エブシ0.3-1.5
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力虚弱で、冷えがあつて、疲労倦怠感があり、ときに下痢、腹痛、めまいがあるものの次の諸症:
下痢、急・慢性胃腸炎、胃腸虚弱、めまい、動悸、感冒、むくみ、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ
- 155 117 参苓白朮散
〔成分・分量〕 人参1.5-3、山薬1.2-4、白朮1.5-4、茯苓1.5-4、薏苡仁0.8-8、扁豆1-4、蓮肉0.8-4、桔梗0.8-2.5、縮砂0.8-2、甘草0.8-2
- 〔用法・用量〕 (1)散:1回1.5-2g 1日3回
(2)湯
- 〔効能・効果〕 体力虚弱で、胃腸が弱く、瘦せて顔色が悪く、食欲がなく下痢が続く傾向があるものの次の諸症:
食欲不振、慢性下痢、病後の体力低下、疲労倦怠、消化不良、慢性胃腸炎
- 157 118 清湿化痰湯
〔成分・分量〕 天南星3、黄芩3、生姜1(ヒネショウガを使用する場合3)、半夏3-4、茯苓3-4、蒼朮3-4(白朮も可)、陳皮2-3、羌活1.5-3、白芷1.5-3、白芥子1.5-3、甘草1-1.5
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度以下で、背中に冷感があり痛みがあるものの次の諸症:
神経痛、関節痛、筋肉痛

- 158 119 清上蠲痛湯(驅風触痛湯)
〔成分・分量〕
麦門冬2.5-6、黄芩3-5、羌活2.5-3、独活2.5-3、防風2.5-3、蒼朮2.5-3(白朮も可)、当歸2.5-3、川芎2.5-3、白芷2.5-3、蔓荊子1.5-2、細辛1、甘草1、藁本1.5、菊花1.5-2、生姜0.5-1(ヒネシヨウガを使用する場合1.5-2.5)(藁本、菊花、生姜はなくても可)
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力に関わらず使用でき、慢性化した痛みのあるものの次の諸症:
顔面痛、頭痛
- 159 120 清上防風湯
〔成分・分量〕
荊芥1-1.5、黄連1-1.5、薄荷葉1-1.5、枳実1-1.5、甘草1-1.5、山梔子1.5-3、川芎2-3、黄芩2-3、連翹2.5-3、白芷2.5-3、桔梗2.5-3、防風2.5-3
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力中等度以上で、赤ら顔で、ときにのぼせがあるものの次の諸症:
にきび、顔面・頭部の湿疹・皮膚炎、あかはな(酒さ)
- 160 121 清暑益氣湯
〔成分・分量〕
人參3-3.5、白朮3-3.5(蒼朮も可)、麦門冬3-3.5、当歸3、黄耆3、陳皮2-3、五味子1-2、黄柏1-2、甘草1-2
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力虚弱で、疲れやすく、食欲不振、ときに口渴などがあるものの次の諸症:
暑気あたり、暑さによる食欲不振・下痢、夏痩せ、全身倦怠、慢性疾患による体力低下・食欲不振
- 161 122 清心蓮子飲
〔成分・分量〕
蓮肉4-5、麦門冬3-4、茯苓4、人參3-5、車前子3、黄芩3、黄耆2-4、地骨皮2-3、甘草1.5-2
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力中等度以下で、胃腸が弱く、全身倦怠感があり、口や舌が乾き、尿が出しづるものの次の諸症:
残尿感、頻尿、排尿痛、尿のにごり、排尿困難、こしけ(おりもの)
- 162 123 清熱補氣湯
〔成分・分量〕
人參3、白朮3-4、茯苓3-4、当歸3、芍薬3、升麻0.5-1、五味子1、玄参1-2、麦門冬3、甘草1
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力中等度以下で、胃腸が弱いものの次の諸症:
口内炎、口腔や舌の荒れ・痛み、口の乾き・乾燥

- 163 124 清熱補血湯
〔成分・分量〕
当帰3、川芎3、芍薬3、地黄3、玄参1.5、知母1.5、五味子1.5、黄柏1.5、麦門冬1.5-3、柴胡1.5、牡丹皮1.5
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力中等度以下で、胃腸障害はなく、貧血気味で皮膚が乾燥しているものの次の諸症：
口内炎、口腔や舌の荒れ・痛み、口の乾き・乾燥
- 164 125 清肺湯
〔成分・分量〕
黄芩2-2.5、桔梗2-2.5、桑白皮2-2.5、杏仁2-2.5、山梔子2-2.5、天門冬2-2.5、貝母2-2.5、陳皮2-2.5、大棗2-2.5、竹茹2-2.5、茯苓3、当帰3、麦門冬3、五味子0.5-1、生姜1、甘草1
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力中等度で、せきが続き、たんが多くて切れにくいものの次の諸症：
たんの多く出るせき、気管支炎
- 165 126 折衝飲
〔成分・分量〕
牡丹皮3、川芎3、芍薬3、桂皮3、桃仁4-5、当帰4-5、延胡索2-2.5、牛膝2-2.5、紅花1-1.5
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力中等度以上で、下腹部痛があるものの次の諸症：
月経不順、月経痛、月経困難、神経痛、腰痛、肩こり
- 127 洗肝明目湯
〔成分・分量〕
当帰1.5、川芎1.5、芍薬1.5、地黄1.5、黄芩1.5、山梔子1.5、連翹1.5、防風1.5、決明子1.5、黄連1-1.5、荊芥1-1.5、薄荷1-1.5、羌活1-1.5、蔓荊子1-1.5、菊花1-1.5、桔梗1-1.5、蒺藜子1-1.5、甘草1-1.5、石膏1.5-3
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力中等度のものの次の諸症：
目の充血、目の痛み、目の乾燥
- 166 128 川芎茶調散
〔成分・分量〕
白芷2、羌活2、荊芥2、防風2、薄荷葉2、甘草1.5、細茶1.5、川芎3、香附子3-4
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力に関わらず使用でき、頭痛があるものの次の諸症：
かぜ、血の道症^{注)}、頭痛
- 《備考》
注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。
【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

- 167 129 千金鷄鳴散
 [成分・分量] 大黄1-2、当帰4-5、桃仁4-5
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 打撲のはれと痛み
 《備考》
 注) 体力に関わらず、使用できる。
 【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】
- 168 130 千金内托散
 [成分・分量] 黄耆2、当帰3-4、人参2-3、川芎2、防風2、桔梗2、白芷1-2、厚朴2、甘草1-2、桂皮2-4(金銀花2を加えても可)
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力虚弱で、患部が化膿するものの次の諸症：
 化膿性皮膚疾患の初期、痔、軽いとこずれ
- 131 喘四君子湯
 [成分・分量] 人参2-3、白朮2-4、茯苓2-4、陳皮2、厚朴2、縮砂1-2、紫蘇子2、沈香1-1.5、桑白皮1.5-2、当帰2-4、木香1-1.5、甘草1-3、生姜1、大棗2(生姜、大棗なくても可)
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力虚弱で、胃腸の弱いものの次の諸症：
 気管支ぜんそく、息切れ
- 169 132 錢氏白朮散
 [成分・分量] 白朮4、茯苓4、葛根4、人参3、藿香1、木香1、甘草1
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 小児の消化不良の効能については小児用量に注意のこと。
 体力虚弱で、嘔吐や下痢があり、ときに口渴や発熱があるものの次の諸症：
 感冒時の嘔吐・下痢、小児の消化不良
- 170 133 続命湯
 [成分・分量] 麻黄3、桂皮3、当帰3、人参3、石膏3-6、乾姜2-3、甘草2-3、川芎1.5-3、杏仁2.5-4
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度以上のものの次の諸症：
 しびれ、筋力低下、高血圧に伴う症状(めまい、耳鳴り、肩こり、頭痛、頭重、頭部圧迫感)、気管支炎、気管支ぜんそく、神経痛、関節のはれや痛み、頭痛、むくみ

- 142 133A 小續命湯
〔成分・分量〕
麻黄2-4、防已2-3、人参1-3、黄芩2-3、桂皮2-4、甘草1-4、芍薬2-3、川芎2-3、杏仁3-3.5、加工ブシ0.3-1、防風2-4、生姜1-3(ヒネシヨウガを使用する場合4-10)
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力中等度以下のものの次の諸症：
しびれ、筋力低下、気管支ぜんそく、気管支炎
- 171 134 疎経活血湯
〔成分・分量〕
当帰2-3.5、地黄2-3、川芎2-2.5、蒼朮2-3(白朮も可)、茯苓1-2、桃仁2-3、芍薬2.5-4.5、牛膝1.5-3、威靈仙1.5-3、防已1.5-2.5、羌活1.5-2.5、防風1.5-2.5、竜胆1.5-2.5、生姜0.5、陳皮1.5-3、白芷1-2.5、甘草1
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力中等度で、痛みがあり、ときにしびれがあるものの次の諸症：
関節痛、神経痛、腰痛、筋肉痛
- 172 135 蘇子降気湯
〔成分・分量〕
紫蘇子3-5(蘇葉可)、半夏3-5、陳皮2-3、前胡2-3、桂皮2-3、当帰2.5-3、厚朴2-3、大棗1-2、生姜0.5-1又は乾姜0.5-1、甘草1-2
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力虚弱で、足冷えや顔ののぼせがあり、息苦しさのあるものの次の諸症：
慢性気管支炎、気管支ぜんそく
- 173 136 大黄甘草湯
〔成分・分量〕
大黄4-10、甘草1-5
〔用法・用量〕
(1)散：1回0.75-1.5g 1日1-2回
(2)湯
〔効能・効果〕
便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの(にきび)・食欲不振(食欲減退)・腹部膨満・腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和
《備考》
注)体力に関わらず、使用できる。
【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】
- 137 大黄附子湯
〔成分・分量〕
大黄1-3、加工ブシ0.2-1.5、細辛2-3
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力中等度以下で、冷えて、ときに便秘するものの次の諸症：
腹痛、神経痛、便秘

- 174 138 大黃牡丹皮湯
〔成分・分量〕 大黃1-5、牡丹皮1-4、桃仁2-4、芒硝3.6-4、冬瓜子2-6
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以上で、下腹部痛があつて、便秘しがちなものの次の諸症：
月経不順、月経困難、月経痛、便秘、痔疾
- 175 139 大建中湯
〔成分・分量〕 山椒1-2、人參2-3、乾姜3-5、膠飴20-64
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力虚弱で、腹が冷えて痛むものの次の諸症：
下腹部痛、腹部膨満感
- 187 139A 中建中湯
〔成分・分量〕 桂皮4、芍薬6、甘草2、大棗4、山椒2、乾姜1、人參3、(膠飴20を加えることもある)
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、腹痛を伴うものの次の諸症：
慢性胃腸炎、下痢、便秘
- 176 140 大柴胡湯
〔成分・分量〕 柴胡6-8、半夏2.5-8、生姜1-2(ヒネショウガを使用する場合 4-5)、黄芩3、芍薬3、大棗3-4、枳実2-3、大黃1-2
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力が充実して、脇腹からみぞおちあたりにかけて苦しく、便秘の傾向があるもの
の次の諸症：
胃炎、常習便秘、高血圧や肥満に伴う肩こり・頭痛・便秘、神経症、肥満症
- 177 140A 大柴胡湯去大黃
〔成分・分量〕 柴胡6-8、半夏3-8、生姜1-2(ヒネショウガを使用する場合4-5)、黄芩3-6、芍薬3、大棗3、枳実2-3
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以上で、脇腹からみぞおちあたりにかけて苦しいものの次の諸症：
胃炎、高血圧や肥満に伴う肩こり・頭痛、神経症
- 178 141 大半夏湯
〔成分・分量〕 半夏7、人參3、ハチミツ20
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、みぞおちがつかえた感じがあるものの次の諸症：
嘔吐、むかつき、はきけ、悪心

- 142 大防風湯
〔成分・分量〕 地黄2.5-3.5、芍薬2.5-3.5、甘草1.2-1.5、防風2.5-3.5、白朮2.5-4.5(蒼朮も可)、加工ブシ0.5-2、杜仲2.5-3.5、羌活1.2-1.5、川芎2-3、当帰2.5-3.5、牛膝1.2-1.5、生姜0.5-1(乾姜1も可、ヒネショウガを使用する場合1.2-1.5)、黄耆2.5-3.5、人参1.2-1.5、大棗1.2-2
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力虚弱あるいは体力が消耗し衰え、貧血気味なものの次の諸症：
慢性関節炎、関節のはれや痛み、神経痛
- 179 143 沢瀉湯
〔成分・分量〕 沢瀉5-6、白朮2-3
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 めまい、頭重
《備考》 注)体力に関わらず、使用できる。
【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】
- 183 144 治頭痛一方
〔成分・分量〕 連翹3-4、蒼朮3-4、川芎3、防風2-3、忍冬2-3、荊芥1-4、甘草0.5-1.5、紅花0.5-2、大黃0.5-2
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以上のものの顔面、頭部などの皮膚疾患で、ときにかゆみ、分泌物などがあるものの次の諸症：
湿疹・皮膚炎、乳幼児の湿疹・皮膚炎
- 184 144A 治頭痛一方去大黃
〔成分・分量〕 連翹3、蒼朮3、川芎3、防風2、忍冬2、荊芥1、甘草1、紅花1
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、下痢傾向があるものの顔面、頭部などの皮膚疾患で、ときにかゆみ、分泌物などがあるものの次の諸症：
湿疹・皮膚炎、乳幼児の湿疹・皮膚炎
- 182 145 治打撲一方
〔成分・分量〕 川芎3、樸楸(又は桜皮)3、川骨3、桂皮3、甘草1.5、丁子1-1.5、大黃1-1.5
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力に関わらず使用でき、はれ、痛みがあるものの次の諸症：
打撲、捻挫

- 186 146 中黄膏
〔成分・分量〕
ゴマ油1,000mL、黄蠟380、鬱金40、黄柏20
〔用法・用量〕
外用
〔効能・効果〕
急性化膿性皮膚疾患(はれもの)の初期、うち身、捻挫
- 188 147 調胃承気湯
〔成分・分量〕
大黄2-6.4、芒硝1-6.5、甘草1-3.2
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力中等度なものの次の諸症：
便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの(にきび)・食欲不振(食欲減退)・腹部膨満、腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和
- 189 148 丁香柿蒂湯
〔成分・分量〕
柿蒂3、桂皮3、半夏3、陳皮3、丁子1、良姜1、木香1、沈香1、茴香1、藿香1、厚朴1、縮砂1、甘草1、乳香1
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力中等度以下のものの次の諸症：
しゃっくり、胃腸虚弱
- 190 149 釣藤散
〔成分・分量〕
釣藤鈎3、橘皮3(陳皮も可)、半夏3、麦門冬3、茯苓3、人参2-3、防風2-3、菊花2-3、甘草1、生姜1、石膏5-7
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力中等度で、慢性に経過する頭痛、めまい、肩こりなどがあるものの次の諸症：
慢性頭痛、神経症、高血圧の傾向のあるもの
- 191 150 猪苓湯
〔成分・分量〕
猪苓3-5、茯苓3-5、滑石3-5、沢瀉3-5、阿膠3-5
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力に関わらず使用でき、排尿異常があり、ときに口が渇くものの次の諸症：
排尿困難、排尿痛、残尿感、頻尿、むくみ
- 192 150A 猪苓湯合四物湯
〔成分・分量〕
当帰3、芍薬3、川芎3、地黄3、猪苓3、茯苓3、滑石3、沢瀉3、阿膠3
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力に関わらず使用でき、皮膚が乾燥し、色つやが悪く、胃腸障害のない人で、排尿異常があり口が渇くものの次の諸症：
排尿困難、排尿痛、残尿感、頻尿

- 193 151 通導散
〔成分・分量〕 当帰3、大黃3、芒硝3-4、枳実(枳殼でも可)2-3、厚朴2、陳皮2、木通2、紅花2-3、蘇木2、甘草2-3
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以上で、下腹部に圧痛があつて便秘しがちなものの次の諸症：
月経不順、月経痛、更年期障害、腰痛、便秘、打ち身(打撲)、高血圧の随伴症状(頭痛、めまい、肩こり)
- 195 152 桃核承気湯
〔成分・分量〕 桃仁5、桂皮4、大黃3、芒硝2、甘草1.5
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以上で、のぼせて便秘しがちなものの次の諸症：
月経不順、月経困難症、月経痛、月経時や産後の精神不安、腰痛、便秘、高血圧の随伴症状(頭痛、めまい、肩こり)、痔疾、打撲症
- 198 153 当帰散
〔成分・分量〕 当帰2-3、芍薬2-3、川芎2-3、黄芩2-3、白朮1-1.5(蒼朮も可)
〔用法・用量〕 (1)散：1回1-2g 1日3回
(2)湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下のものの次の諸症：
産前産後の障害(貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ)
- 200 154 当帰四逆湯
〔成分・分量〕 当帰1.8-4、桂皮1.8-4、芍薬1.8-4、木通2-3、大棗1.8-6.5、細辛1.8-3、甘草1.2-2.5
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、手足が冷えて下腹部が痛くなりやすいものの次の諸症：
しもやけ、下腹部痛、腰痛、下痢、月経痛、冷え症
- 199 154A 当帰四逆加呉茱萸生姜湯
〔成分・分量〕 当帰3-4、桂皮3-4、芍薬3-4、木通1.5-3、細辛2-3、甘草1.5-2、大棗4-6.5、呉茱萸1-6、生姜0.5-2(ヒネシヨウガを使用する場合4-8)
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、手足の冷えを感じ、下肢の冷えが強く、下肢又は下腹部が痛くなりやすいものの次の諸症：
冷え症、しもやけ、頭痛、下腹部痛、腰痛、下痢、月経痛

- 201 155 当帰芍薬散
〔成分・分量〕
当帰3-3.9、川芎3、芍薬4-16、茯苓4-5、白朮4-5(蒼朮も可)、沢瀉4-12
〔用法・用量〕
(1)散:1回1-2g 1日3回
(2)湯
〔効能・効果〕
体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症:
月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害(貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ)、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り
- 202 155A 当帰芍薬散加黄耆釣藤
〔成分・分量〕
当帰3、沢瀉4、川芎3、芍薬4、茯苓4、蒼朮4(白朮も可)、黄耆3、釣藤鈎4
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力虚弱で血圧が高く、冷え症で貧血の傾向があり、疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症:
高血圧の随伴症状(のぼせ、肩こり、耳鳴り、頭重)
- 203 155B 当帰芍薬散加人参
〔成分・分量〕
当帰3.5、沢瀉3.5、川芎3、芍薬4、茯苓3.5、白朮3(蒼朮も可)、人参1-2
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力虚弱で胃腸が弱く、冷え症で貧血の傾向があり、疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症:
月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害(貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ)、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り
- 204 155C 当帰芍薬散加附子
〔成分・分量〕
当帰3、沢瀉4、川芎3、加エブシ0.4、芍薬4、茯苓4、白朮4(蒼朮も可)
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力虚弱で、冷えが強く、貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などがあるものの次の諸症:
月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害(貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ)、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り

- 205 156 当帰湯
〔成分・分量〕 当帰5、半夏5、芍薬3、厚朴3、桂皮3、人参3、乾姜1.5、黄耆1.5、山椒1.5、甘草1
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、背中に冷感があり、腹部膨満感や腹痛・胸背部痛のあるもの
の次の諸症：
胸痛、腹痛、胃炎
- 206 157 当帰貝母苦参丸料
〔成分・分量〕 当帰3、貝母3、苦参3
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下のものの次の諸症：
小便がしぶって出にくいもの、排尿困難
- 208 158 独活湯
〔成分・分量〕 独活2、羌活2、防風2、桂皮2、大黃2、沢瀉2、当帰3、桃仁3、連翹3、防己5、黄柏
5、甘草1.5
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度なものの次の諸症：
腰痛、手足の屈伸痛
- 209 159 二朮湯
〔成分・分量〕 白朮1.5-2.5、茯苓1.5-2.5、陳皮1.5-2.5、天南星1.5-2.5、香附子1.5-2.5、黄芩1.5-
2.5、威靈仙1.5-2.5、羌活1.5-2.5、半夏2-4、蒼朮1.5-3、甘草1-1.5、生姜0.6-1
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度で、肩や上腕などに痛みがあるものの次の諸症：
四十肩、五十肩
- 210 160 二陳湯
〔成分・分量〕 半夏5-7、茯苓3.5-5、陳皮3.5-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合2-3)、甘
草1-2
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度で、悪心、嘔吐があるものの次の諸症：
悪心、嘔吐、胃部不快感、慢性胃炎、二日酔

- 46 160A 枳縮二陳湯
〔成分・分量〕 枳実1-3、縮砂1-3、半夏2-3、陳皮2-3、香附子2-3、木香1-2、草豆蔻1-2、乾姜1-2、厚朴1.5-2.5、茴香1-2.5、延胡索1.5-2.5、甘草1、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3)、茯苓2-3
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、胃腸が弱いものの次の諸症：
悪心、嘔吐、胃痛、胃部不快感、胸痛
- 211 161 女神散(安栄湯)
〔成分・分量〕 当帰3-4、川芎3、白朮3(蒼朮も可)、香附子3-4、桂皮2-3、黄芩2-4、人参1.5-2、檳榔子2-4、黄連1-2、木香1-2、丁子0.5-1、甘草1-1.5、大黃0.5-1(大黃はなくても可)
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以上で、のぼせとめまいのあるものの次の諸症：
産前産後の神経症、月経不順、血の道症^{注)}、更年期障害、神経症
《備考》 注)血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。
【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。]
- 212 162 人参湯(理中丸)
〔成分・分量〕 人参3、甘草3、白朮3(蒼朮も可)、乾姜2-3
〔用法・用量〕 (1)散：1回2-3g 1日3回
(2)湯
〔効能・効果〕 体力虚弱で、疲れやすく手足などが冷えやすいものの次の諸症：
胃腸虚弱、下痢、嘔吐、胃痛、腹痛、急・慢性胃炎
- 73 162A 桂枝人参湯
〔成分・分量〕 桂皮4、甘草3-4、人参3、乾姜2-3、白朮3(蒼朮も可)
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力虚弱で、胃腸が弱く、ときに発熱・悪寒を伴うものの次の諸症：
頭痛、動悸、慢性胃腸炎、胃腸虚弱、下痢、消化器症状を伴う感冒
- 233 162B 附子理中湯
〔成分・分量〕 人参3、加工ブシ0.5-1、乾姜2-3、甘草2-3、白朮3(蒼朮も可)
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力虚弱で、手足の冷えが強く、疲れやすいものの次の諸症：
胃腸虚弱、下痢、嘔吐、胃痛、腹痛、急・慢性胃炎

- 213 163 人参養栄湯
〔成分・分量〕 人参3、当帰4、芍薬2-4、地黄4、白朮4(蒼朮も可)、茯苓4、桂皮2-2.5、黄耆1.5-2.5、陳皮(橘皮も可)2-2.5、遠志1-2、五味子1-1.5、甘草1-1.5
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力虚弱なもの次の諸症：
病後・術後などの体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血
- 215 164 排膿散及湯
〔成分・分量〕 桔梗3-4、甘草3、大棗3-6、芍薬3、生姜0.5-1(ヒネシヨウガを使用する場合2-3)、枳実2-3
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 化膿性皮膚疾患の初期又は軽いもの、歯肉炎、扁桃炎
《備考》 注) 体力に関わらず、使用できる。
【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。
- 214 164A 排膿散
〔成分・分量〕 枳実3-10、芍薬3-6、桔梗1.5-2、卵黄1個(卵黄はない場合も可)
〔用法・用量〕 (1)散:1回1.5-4g 1日1-2回
(2)湯(卵黄ははぶくのが普通)
生薬を細末とし1回量2-3gに卵黄を加えて、よく攪拌し白湯にて服す。1日1-2回頓服として用いる。
〔効能・効果〕 体力中等度以上で、患部が化膿するもの次の諸症：
化膿性皮膚疾患の初期又は軽いもの、歯肉炎、扁桃炎
《備考》 排膿散の湯液剤は排膿湯の処方と区別するため排膿散料と称する。
- 216 164B 排膿湯
〔成分・分量〕 甘草1.5-3、桔梗1.5-5、生姜0.5-1(ヒネシヨウガを使用する場合1-3)、大棗2.5-6
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、患部が化膿するもの次の諸症：
化膿性皮膚疾患・歯肉炎・扁桃炎の初期または軽いもの
- 217 165 麦門冬湯
〔成分・分量〕 麦門冬8-10、半夏5、粳米5-10、大棗2-3、人参2、甘草2
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、たんが切れにくく、ときに強くせきこみ、又は咽頭の乾燥感があるもの次の諸症：
からぜき、気管支炎、気管支ぜんそく、咽頭炎、しわがれ声

- 181 165A 竹葉石膏湯
〔成分・分量〕
竹葉1.2-2、石膏4.8-16、半夏1.6-8、麥門冬3.4-12、人參0.8-3、甘草0.6-2、粳米2-8.5
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力虚弱で、かぜが治りきらず、たんが切れにくく、ときに熱感、強いせきこみ、口が渇くものの次の諸症：
からぜき、気管支炎、気管支ぜんそく、口渇、軽い熱中症
- 219 166 八味地黄丸
〔成分・分量〕
地黄5、6-8、山茱萸3、3-4、山藥3、3-4、沢瀉3、3、茯苓3、3、牡丹皮3、3、桂皮1、1、加エブシ0.5-1、0.5-1(左側の数字は湯、右側は散)
〔用法・用量〕
(1)散:1回2g 1日3回
(2)湯
〔効能・効果〕
体力中等度以下で、疲れやすく、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿で、ときに口渇があるものの次の諸症：
下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)、軽い尿漏れ
- 87 166A 杞菊地黄丸
〔成分・分量〕
地黄5-8、8、山茱萸3-4、4、山藥4、4、沢瀉3、3、茯苓3、3、牡丹皮2-3、3、枸杞子4-5、5、菊花3、3(左側の数字は湯、右側は散)
〔用法・用量〕
(1)散:1回2g 1日3回
(2)湯
〔効能・効果〕
体力中等度以下で、疲れやすく胃腸障害がなく、尿量減少又は多尿で、ときに手足のほてりや口渇があるものの次の諸症：
かすみ目、つかれ目、のぼせ、頭重、めまい、排尿困難、頻尿、むくみ、視力低下
- 91 166B 牛車腎気丸
〔成分・分量〕
地黄5-8、山茱萸2-4、山藥3-4、沢瀉3、茯苓3-4、牡丹皮3、桂皮1-2、加エブシ0.5-1、牛膝2-3、車前子2-3
〔用法・用量〕
(1)散:1回2g 1日3回
(2)湯
〔効能・効果〕
体力中等度以下で、疲れやすく、四肢が冷えやすく尿量減少し、むくみがあり、ときに口渇があるものの次の諸症：
下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)

- 185 166C 知柏地黄丸
〔成分・分量〕 地黄8、山茱萸4、山藥4、沢瀉3、茯苓3、牡丹皮3、知母3、黄柏3
〔用法・用量〕 (1)散:1回2g 1日3回
(2)湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、疲れやすく胃腸障害がなく、口渴があるものの次の諸症:
顔や四肢のほてり、排尿困難、頻尿、むくみ
- 247 166D 味麦地黄丸
〔成分・分量〕 地黄8、山茱萸4、山藥4、沢瀉3、茯苓3、牡丹皮3、麦門冬6、五味子2
〔用法・用量〕 (1)散:1回2g 1日3回
(2)湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、疲れやすく胃腸障害がなく、ときにせき、口渴があるものの次の諸症:
下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ、息切れ、からぜき
- 263 166E 六味丸(六味地黄丸)
〔成分・分量〕 地黄5-6、4-8、山茱萸3、3-4、山藥3、3-4、沢瀉3、3、茯苓3、3、牡丹皮3、3
(左側の数字は湯、右側は散)
〔用法・用量〕 (1)散:1回2g 1日3回
(2)湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、疲れやすく尿量減少又は多尿で、ときに手足のほてり、口渴があるものの次の諸症:
排尿困難、残尿感、頻尿、むくみ、かゆみ、夜尿症、しびれ
- 167 八味疝氣方
〔成分・分量〕 桂皮3-4、木通3-4、延胡索3-4、桃仁3-6、烏藥3、牽牛子1-3、大黄1、牡丹皮3-4
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以上で、冷えがあるものの次の諸症:
下腹部の痛み、腰痛、こむら返り、月経痛
- 220 168 半夏厚朴湯
〔成分・分量〕 半夏6-8、茯苓5、厚朴3、蘇葉2-3、生姜1-2(ヒネショウガを使用する場合2-4)
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度をめやすとして、気分がふさいで、咽喉・食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症:
不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声、のどのつかえ感

- 169 半夏散及湯
〔成分・分量〕 半夏3-6、桂皮3-4、甘草2-3
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 のどの痛み、扁桃炎、のどのあれ、声がれ
《備考》 注)体力に関わらず、使用できる。
【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】
- 221 170 半夏瀉心湯
〔成分・分量〕 半夏4-6、黄芩2.5-3、乾姜2-3、人参2.5-3、甘草2.5-3、大棗2.5-3、黄連1
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度で、みぞおちがつかえた感じがあり、ときに悪心、嘔吐があり食欲不振で腹が鳴って軟便又は下痢の傾向のあるものの次の諸症：
急・慢性胃腸炎、下痢・軟便、消化不良、胃下垂、神経性胃炎、胃弱、二日酔、げっぷ、胸やけ、口内炎、神経症
- 40 170A 甘草瀉心湯
〔成分・分量〕 半夏5、黄芩2.5、乾姜2.5、人参2.5、甘草2.5-3.5、大棗2.5、黄連1
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度で、みぞおちがつかえた感じがあり、ときにイライラ感、下痢、はきけ、腹が鳴るものの次の諸症：
胃腸炎、口内炎、口臭、不眠症、神経症、下痢
- 134 170B 生姜瀉心湯
〔成分・分量〕 半夏5-8、人参2.5-4、黄芩2.5-4、甘草2.5-4、大棗2.5-4、黄連1、乾姜1-2、生姜1-2(ヒネショウガを使用する場合2-4)
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度で、みぞおちがつかえた感じがあり、はきけやげっぷを伴うものの次の諸症：
食欲不振、胸やけ、はきけ、嘔吐、下痢、胃腸炎、口臭
- 222 171 半夏白朮天麻湯
〔成分・分量〕 半夏3、白朮1.5-3、陳皮3、茯苓3、麦芽1.5-2、天麻2、生姜0.5-2(ヒネショウガを使用する場合2-4)、神麴1.5-2、黄耆1.5-2、人参1.5-2、沢瀉1.5-2、黄柏1、乾姜0.5-1(神麴のない場合も可)(蒼朮2-3を加えても可)
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、胃腸が弱く下肢が冷えるものの次の諸症：
頭痛、頭重、立ちくらみ、めまい、蓄膿症(副鼻腔炎)

172. 白朮附子湯
〔成分・分量〕 白朮2-4、加工ブシ0.3-1、甘草1-2、生姜0.5-1(ヒネショウガを用いる場合1.5-3)、大棗2-4
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力虚弱で、手足が冷え、ときに頻尿があるものの次の諸症：
筋肉痛、関節のはれや痛み、神経痛、しびれ、めまい、感冒
- 225 173 白虎湯
〔成分・分量〕 知母5-6、粳米8-10、石膏15-16、甘草2
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以上で、熱感、口渴があるものの次の諸症：
のどの渇き、ほてり、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ
- 223 173A 白虎加桂枝湯
〔成分・分量〕 知母5-6、粳米8-10、石膏15-16、甘草2、桂皮3-4
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以上で、熱感、口渴、のぼせがあるものの次の諸症：
のどの渇き、ほてり、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ
- 224 173B 白虎加人參湯
〔成分・分量〕 知母5-6、石膏15-16、甘草2、粳米8-20、人參1.5-3
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以上で、熱感と口渴が強いものの次の諸症：
のどの渇き、ほてり、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ
- 227 174 伏竜肝湯
〔成分・分量〕 伏竜肝4-10、ヒネショウガ5-8(生姜を使用する場合1.5-3)、半夏6-8、茯苓3-5
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 つわり、悪心、嘔吐
《備考》 注)体力に関わらず、使用できる。
【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】
- 228 175 茯苓飲
〔成分・分量〕 茯苓2.4-5、白朮2.4-4(蒼朮も可)、人參2.4-3、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、陳皮2.5-3、枳実1-2
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、はきけや胸やけ、上腹部膨満感があり尿量減少するものの次の諸症：
胃炎、神経性胃炎、胃腸虚弱、胸やけ

- 229 175A 茯苓飲加半夏
〔成分・分量〕 茯苓5、白朮4(蒼朮も可)、人參3、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、陳皮3、枳実1.5、半夏4
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、はきけや胸やけが強く、上腹部膨満感があり尿量減少するものの次の諸症：
胃炎、神経性胃炎、胃腸虚弱、胸やけ
- 230 175B 茯苓飲合半夏厚朴湯
〔成分・分量〕 茯苓4-6、白朮3-4(蒼朮も可)、人參3、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合4-5)、陳皮3、枳実1.5-2、半夏6-10、厚朴3、蘇葉2
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、気分がふさいで咽喉食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気、胸やけ、上腹部膨満感などがあり、尿量減少するものの次の諸症：
不安神経症、神経性胃炎、つわり、胸やけ、胃炎、しわがれ声、のどのつかえ感
- 176 茯苓杏仁甘草湯
〔成分・分量〕 茯苓3-6、杏仁2-4、甘草1-2
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、胸につかえがあるものの次の諸症：
息切れ、胸の痛み、気管支ぜんそく、せき、動悸
- 231 177 茯苓四逆湯
〔成分・分量〕 茯苓4-4.8、甘草2-3、乾姜1.5-3、人參1-3、加エブシ0.3-1.5
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力虚弱あるいは体力が消耗し、手足が冷えるものの次の諸症：
倦怠感、急・慢性胃腸炎、下痢、はきけ、尿量減少
- 232 178 茯苓沢瀉湯
〔成分・分量〕 茯苓4-8、沢瀉2.4-4、白朮1.8-3(蒼朮も可)、桂皮1.2-2、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合2.4-4)、甘草1-1.5
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、胃のもたれ、悪心、嘔吐のいずれかがあり、渇きを覚えるものの次の諸症：
胃炎、胃腸虚弱

- 179 附子粳米湯
〔成分・分量〕 加工ブシ0.3-1.5、半夏5-8、大棗2.5-3、甘草1-2.5、粳米6-8
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力虚弱で、腹部が冷えて痛み、腹が鳴るものの次の諸症：
胃痛、腹痛、嘔吐、急性胃腸炎
- 180 扶脾生脈散
〔成分・分量〕 人参2、当帰4、芍薬3-4、紫苑2、黄耆2、麦門冬6、五味子1.5、甘草1.5
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、出血傾向があり、せき、息切れがあるものの次の諸症：
鼻血、歯肉からの出血、痔出血、気管支炎
- 234 181 分消湯(実脾飲)
〔成分・分量〕 白朮2.5-3、蒼朮2.5-3、茯苓2.5-3、陳皮2-3、厚朴2-3、香附子2-2.5、猪苓2-2.5、沢瀉2-2.5、枳実(枳殼)1-3、大腹皮1-2.5、縮砂1-2、木香1、生姜1、燈心草1-2
(但し、枳殼を用いる場合は実脾飲とする)
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以上で、尿量が少なく、ときにみぞおちがつかえて便秘の傾向のあるものの次の諸症：
むくみ、排尿困難、腹部膨満感
- 235 182 平胃散
〔成分・分量〕 蒼朮4-6(白朮も可)、厚朴3-4.5、陳皮3-4.5、大棗2-3、甘草1-1.5、生姜0.5-1
〔用法・用量〕 原則として湯
(1)散:1回2g 1日3回
(2)湯
〔効能・効果〕 体力中等度以上で、胃がもたれて消化が悪く、ときにはきげ、食後に腹が鳴って下痢の傾向のあるものの次の諸症：
食べ過ぎによる胃のもたれ、急・慢性胃炎、消化不良、食欲不振
- 37 182A 加味平胃散
〔成分・分量〕 蒼朮4-6(白朮も可)、陳皮3-4.5、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合2-3)、神麴2-3、山楂子2-3、厚朴3-4.5、甘草1-2、大棗2-3、麦芽2-3 (山楂子はなくても可)
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度で、胃がもたれて食欲がなく、ときに胸やけがあるものの次の諸症：
急・慢性胃炎、食欲不振、消化不良、胃腸虚弱、腹部膨満感

- 82 182B 香砂平胃散
〔成分・分量〕 蒼朮4-6(白朮も可)、厚朴3-4.5、陳皮3-4.5、甘草1-1.5、縮砂1.5-2、香附子2-4、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合2-3)、大棗2-3、藿香1 (藿香はなくても可)
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度で、食べ過ぎて胃がもたれる傾向のあるものの次の諸症：
食欲異常、食欲不振、急・慢性胃炎、消化不良
- 226 182C 不換金正気散
〔成分・分量〕 蒼朮4(白朮も可)、厚朴3、陳皮3、大棗1-3、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合2-3)、半夏6、甘草1.5、藿香1-1.5
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度で、胃がもたれて食欲がなく、ときにはきけがあるものの次の諸症：
急・慢性胃炎、胃腸虚弱、消化不良、食欲不振、消化器症状のある感冒
- 236 183 防已黄耆湯
〔成分・分量〕 防已4-5、黄耆5、白朮3(蒼朮も可)、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3)、大棗3-4、甘草1.5-2
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるものの次の諸症：
肥満に伴う関節の腫れや痛み、むくみ、多汗症、肥満症(筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり)
- 237 184 防已茯苓湯
〔成分・分量〕 防已2.4-3、黄耆2.4-3、桂皮2.4-3、茯苓4-6、甘草1.5-2
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、手足のむくみや冷えやすい傾向のあるものの次の諸症：
手足の疼痛・しびれ感、むくみ、めまい、慢性下痢
- 238 185 防風通聖散
〔成分・分量〕 当帰1.2-1.5、芍薬1.2-1.5、川芎1.2-1.5、山梔子1.2-1.5、連翹1.2-1.5、薄荷葉1.2-1.5、生姜0.3-0.5(ヒネショウガを使用する場合1.2-1.5)、荊芥1.2-1.5、防風1.2-1.5、麻黄1.2-1.5、大黃1.5、芒硝1.5、白朮2、桔梗2、黄芩2、甘草2、石膏2、滑石3 (白朮のない場合も可)
〔用法・用量〕 原則として湯
(1)散:1回2g、1日3回
(2)湯
〔効能・効果〕 体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症：
高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症(副鼻腔炎)、湿疹・皮膚炎、ふきでもの(にきび)、肥満症

- 239 186 補気健中湯(補気建中湯)
〔成分・分量〕 白朮3-5、蒼朮2.5-3.5、茯苓3-5、陳皮2.5-3.5、人參1.5-4、黄芩2-3、厚朴2、沢瀉2-4、麦門冬2-8
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力虚弱で、胃腸が弱いものの次の諸症：
腹部膨満感、むくみ
- 240 187 補中益気湯
〔成分・分量〕 人參3-4、白朮3-4(蒼朮も可)、黄耆3-4.5、当歸3、陳皮2-3、大棗1.5-3、柴胡1-2、甘草1-2、生姜0.5、升麻0.5-2
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力虚弱で、元気がなく、胃腸のはたらきが衰えて、疲れやすいものの次の諸症：
虚弱体質、疲労倦怠、病後・術後の衰弱、食欲不振、ねあせ、感冒
- 241 188 補肺湯
〔成分・分量〕 麦門冬4、五味子3、桂皮3、大棗3、粳米3、桑白皮3、款冬花2、生姜0.5-1(ヒネシヨウガを使用する場合2-3)
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下のものの次の諸症：
せき、しわがれ声
- 189 補陽還五湯
〔成分・分量〕 黄耆5、当歸3、芍薬3、地竜2、川芎2、桃仁2、紅花2
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力虚弱なものの次の諸症：
しびれ、筋力低下、頻尿、軽い尿漏れ
- 190 奔豚湯(金匱要略)
〔成分・分量〕 甘草2、川芎2、当歸2、半夏4、黄芩2、葛根5、芍薬2、生姜1-1.5(ヒネシヨウガを使用する場合4)、李根白皮5-8(桑白皮でも可)
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度で、下腹部から動悸が胸やのどに突き上げる感じがするものの次の諸症：
発作性の動悸、不安神経症
- 191 奔豚湯(肘后方)
〔成分・分量〕 甘草2、人參2、桂皮4、呉茱萸2、生姜1、半夏4
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、下腹部から動悸が胸やのどに突き上げる感じがするものの次の諸症：
発作性の動悸、不安神経症

- 242 192 麻黄湯
〔成分・分量〕 麻黄3-5、桂皮2-4、杏仁4-5、甘草1-1.5
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力充実して、かぜのひきはじめて、さむけがして発熱、頭痛があり、せきが出て身体のふしぶしが痛く汗が出ていないものの次の諸症：
感冒、鼻かぜ、気管支炎、鼻づまり
(使用上の注意：身体虚弱の人は使用しないこと)
- 243 193 麻黄附子細辛湯
〔成分・分量〕 麻黄2-4、細辛2-3、加工ブシ0.3-1
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力虚弱で、手足に冷えがあり、ときに悪寒があるものの次の諸症：
感冒、アレルギー性鼻炎、気管支炎、気管支ぜんそく、神経痛
- 244 194 麻杏甘石湯
〔成分・分量〕 麻黄4、杏仁4、甘草2、石膏10
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以上で、せきが出て、ときにのどが渴くものの次の諸症：
せき、小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎、感冒、痔の痛み
- 88 194A 五虎湯
〔成分・分量〕 麻黄4、杏仁4、甘草2、石膏10、桑白皮1-3
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以上で、せきが強くでるものの次の諸症：
せき、気管支ぜんそく、気管支炎、小児ぜんそく、感冒、痔の痛み
- 245 195 麻杏薏甘湯
〔成分・分量〕 麻黄4、杏仁3、薏苡仁10、甘草2
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度なものの次の諸症：
関節痛、神経痛、筋肉痛、いぼ、手足のあれ(手足の湿疹・皮膚炎)
- 246 196 麻子仁丸
〔成分・分量〕 麻子仁4-5、芍薬2、枳実2、厚朴2-2.5、大黄3.5-4、杏仁2-2.5 (甘草1.5を加えても可)
〔用法・用量〕 (1)散：1回2-3g 1日1-3回
(2)湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、ときに便が硬く塊状なものの次の諸症：
便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの(にきび)・食欲不振(食欲減退)・腹部膨満・腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和

- 197 木防已湯
〔成分・分量〕 防已2.4-6、石膏6-12、桂皮1.6-6、人参2-4(竹節人参4でも可)
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以上で、みぞおちがつかえ、血色すぐれないものの次の諸症：
動悸、息切れ、気管支ぜんそく、むくみ
- 249 198 楊柏散
〔成分・分量〕 楊梅皮2、黄柏2、犬山椒1
〔用法・用量〕 外用である。細末を混和し、うすい酢又は水で泥状として患部に塗る。
〔効能・効果〕 捻挫、打撲
- 250 199 薏苡仁湯
〔成分・分量〕 麻黄4、当帰4、蒼朮4(白朮も可)、薏苡仁8-10、桂皮3、芍薬3、甘草2
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度で、関節や筋肉のはれや痛みがあるものの次の諸症：
関節痛、筋肉痛、神経痛
- 200 薏苡附子敗醬散
〔成分・分量〕 薏苡仁1-16、加エブシ0.2-2、敗醬0.5-8
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力虚弱なものの次の諸症：
熱を伴わない下腹部の痛み、湿疹・皮膚炎、肌あれ、いぼ
- 251 201 抑肝散
〔成分・分量〕 当帰3、釣藤鈎3、川芎3、白朮4(蒼朮も可)、茯苓4、柴胡2-5、甘草1.5
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度をめやすとして、神経がたかぶり、怒りやすい、イライラなどがあるもの
の次の諸症：
神経症、不眠症、小児夜泣き、小児疳症(神経過敏)、歯ぎしり、更年期障害、血の
道症^{注)}
《備考》
注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に
伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。
【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する
注意〉として記載する。】

- 252 201A 抑肝散加芍薬黄連
〔成分・分量〕
当帰5.5、釣藤鈎1.5、川芎2.7、白朮5.3(蒼朮も可)、茯苓6.5、柴胡2、甘草0.6、芍薬4、黄連0.3
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力中等度以上をめやすとして、神経のたかぶりが強く、怒りやすい、イライラなどがあるものの次の諸症：
神経症、不眠症、小児夜泣き、小児疳症(神経過敏)、歯ぎしり、更年期障害、血の道症^{注)}
- 《備考》
注)血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。
【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】
- 253 201B 抑肝散加陳皮半夏
〔成分・分量〕
当帰3、釣藤鈎3、川芎3、白朮4(蒼朮も可)、茯苓4、柴胡2-5、甘草1.5、陳皮3、半夏5
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力中等度をめやすとして、やや消化器が弱く、神経がたかぶり、怒りやすい、イライラなどがあるものの次の諸症：
神経症、不眠症、小児夜泣き、小児疳症(神経過敏)、更年期障害、血の道症^{注)}、歯ぎしり
- 《備考》
注)血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。
【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】
- 254 202 六君子湯
〔成分・分量〕
人參2-4、白朮3-4(蒼朮も可)、茯苓3-4、半夏3-4、陳皮2-4、大棗2、甘草1-1.5、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合1-2)
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力中等度以下で、胃腸が弱く、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症：
胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐
- 21 202A 化食養脾湯
〔成分・分量〕
人參4、白朮4、茯苓4、半夏4、陳皮2、大棗2、神麴2、麦芽2、山楂子2、縮砂1.5、生姜1、甘草1
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力中等度以下で、胃腸が弱く、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすいものの次の諸症：
胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐

- 84 202B. 香砂六君子湯
〔成分・分量〕 人参3-4、白朮3-4(蒼朮も可)、茯苓3-4、半夏3-6、陳皮2-3、香附子2-3、大棗1.5-2、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合1-2)、甘草1-1.5、縮砂1-2、藿香1-2
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、気分が沈みがちで頭が重く、胃腸が弱く、食欲がなく、みぞおちがつかえて疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症：
胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐
- 102 202C 柴芍六君子湯
〔成分・分量〕 人参3-4、白朮3-4(蒼朮も可)、茯苓3-4、半夏4、陳皮2-3、大棗2、甘草1-2、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合1-2)、柴胡3-4、芍薬3-4
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、神経質であり、胃腸が弱くみぞおちがつかえ、食欲不振、腹痛、貧血、冷え症の傾向のあるものの次の諸症：
胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐、神経性胃炎
- 218 202D 八解散
〔成分・分量〕 半夏3、茯苓3、陳皮3、大棗2、甘草2、厚朴6、人参3、藿香3、白朮3、生姜1(ヒネショウガを使用する場合2)
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力虚弱で、胃腸が弱いものの次の諸症：
発熱、下痢、嘔吐、食欲不振のいずれかを伴う感冒
- 255 203 立効散
〔成分・分量〕 細辛1.5-2、升麻1.5-2、防風2-3、甘草1.5-2、竜胆1-1.5
〔用法・用量〕 湯(口に含んでゆっくり飲む)
〔効能・効果〕 歯痛、抜歯後の疼痛
《備考》 注) 体力に関わらず、使用できる。
【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】
- 256 204 竜胆瀉肝湯
〔成分・分量〕 当帰5、地黄5、木通5、黄芩3、沢瀉3、車前子3、竜胆1-1.5、山梔子1-1.5、甘草1-1.5
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以上で、下腹部に熱感や痛みがあるものの次の諸症：
排尿痛、残尿感、尿のにごり、こしけ(おりもの)、頻尿

- 205 苓甘姜味辛夏仁湯
 [成分・分量] 茯苓1.6-4、甘草1.2-3、半夏2.4-5、乾姜1.2-3(生姜2でも可)、杏仁2.4-4、五味子1.5-3、細辛1.2-3
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度又はやや虚弱で、胃腸が弱り、冷え症で薄い水様のたんが多いものの次の諸症：
 気管支炎、気管支ぜんそく、動悸、息切れ、むくみ
- 257 206 苓姜朮甘湯
 [成分・分量] 茯苓4-6、乾姜3-4、白朮2-3(蒼朮も可)、甘草2
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度以下で、腰から下肢に冷えと痛みがあつて、尿量が多いものの次の諸症：
 腰痛、腰の冷え、夜尿症、神経痛
- 258 207 苓桂甘棗湯
 [成分・分量] 茯苓4-8、桂皮4、大棗4、甘草2-3
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度以下で、のぼせや動悸があり神経がたかぶるものの次の諸症：
 動悸、精神不安
- 259 208 苓桂朮甘湯
 [成分・分量] 茯苓4-6、白朮2-4(蒼朮も可)、桂皮3-4、甘草2-3
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときにのぼせや動悸があるものの次の諸症：
 立ちくらみ、めまい、頭痛、耳鳴り、動悸、息切れ、神経症、神経過敏
- 194 208A 定悸飲
 [成分・分量] 李根皮2、甘草1.5-2、茯苓4-6、牡蛎3、桂皮3、白朮2-3(蒼朮も可)、呉茱萸1.5-2
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度で、ときにめまい、ふらつき、のぼせがあるものの次の諸症：
 動悸、不安神経症
- 248 208B 明朗飲
 [成分・分量] 茯苓4-6、細辛1.5-2、桂皮3-4、黄連1.5-2、白朮2-4、甘草2、車前子2-3
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度で、ときにめまい、ふらつき、動悸があるものの次の諸症：
 急・慢性結膜炎、目の充血、流涙(なみだ目)

- 262 208C 連珠飲
 [成分・分量] 当帰3-4、白朮2-4(蒼朮も可)、川芎3-4、甘草2-3、芍薬3-4、地黄3-4、茯苓4-6、桂皮3-4
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度又はやや虚弱で、ときにのぼせ、ふらつきがあるものの次の諸症：
 更年期障害、立ちくらみ、めまい、動悸、息切れ、貧血
- 209 苓桂味甘湯
 [成分・分量] 茯苓4-6、甘草2-3、桂皮4、五味子2.5-3
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度以下で、手足が冷えて顔が赤くなるものの次の諸症：
 のぼせ、動悸、からげき、のどのふさがり感、耳のふさがり感
- 260 210 麗沢通気湯
 [成分・分量] 黄耆4、山椒1、蒼朮3、麻黄1、羌活3、白芷4、独活3、生姜1、防風3、大棗1、升麻1、葱白3、葛根3、甘草1 (葱白はなくても可)
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度のものの次の諸症：
 嗅覚異常、嗅覚障害
- 261 210A 麗沢通気湯加辛夷
 [成分・分量] 黄耆4、山椒1、蒼朮3、麻黄1、羌活3、白芷4、独活3、生姜1、防風3、大棗1、升麻1、葱白3、葛根3、甘草1、辛夷3 (葱白はなくても可)
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度のものの次の諸症：
 嗅覚異常、嗅覚障害、鼻づまり、アレルギー性鼻炎、慢性鼻炎、蓄膿症(副鼻腔炎)