

薬生発0328第1号  
平成29年3月28日

各都道府県知事 殿

厚生労働省医薬・生活衛生局長  
(公印省略)

### 一般用漢方製剤製造販売承認基準について

一般用漢方製剤については、「一般用漢方製剤承認基準」(平成24年8月30日薬食審査発0830第1号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知。以下「旧基準」という。)により取り扱ってきたところですが、今般、一部の一般用漢方製剤の製造販売の承認の権限が都道府県知事に委任されることに伴い、「一般用漢方製剤製造販売承認基準」(以下「本基準」という。)として取り扱うこととしましたので、下記の点に御留意の上、貴管下関係業者に対し、周知するとともに、円滑な事務処理が行われるよう御配慮をお願いします。

本基準は、平成29年4月1日以降に製造販売承認申請される品目に適用します。ただし、本基準に適合しないものについては、従前のとおりの審査を行うこととします。

また、本基準の施行に伴い、旧基準は廃止します。

#### 記

##### 1 改正の概要

- (1) 名称を「一般用漢方製剤承認基準」から「一般用漢方製剤製造販売承認基準」に改めたこと。
- (2) 旧基準に記載されていた旧処方番号の削除等の所要の整備を行ったこと。

##### 2 既存の通知等については、本基準を引用する等している場合には、別途の通知等が発出されない限り、必要な読み替えを行った上で、引き続き適用されるものであること。



別添

## 一般用漢方製剤製造販売承認基準

厚生労働省医薬・生活衛生局  
平成29年4月1日

処方番号 処方名

1 安中散

[成分・分量] 桂皮 3-5、延胡索 3-4、牡蠣 3-4、茴香 1.5-2、縮砂 1-2、甘草 1-2、良姜 0.5-1

[用法・用量] (1) 散: 1回 1-2g 1日 2-3回  
(2) 湯

[効能・効果] 体力中等度以下で、腹部は力がなくて、胃痛又は腹痛があつて、ときに胸やけや、げっぷ、胃もたれ、食欲不振、はきけ、嘔吐などを伴うものの次の諸症:  
神経性胃炎、慢性胃炎、胃腸虚弱

1 A 安中散加茯苓

[成分・分量] 桂皮 3-5、延胡索 3-4、牡蠣 3-4、茴香 1.5-2、縮砂 1-2、甘草 1-2、良姜 0.5-1、茯苓 5

[用法・用量] (1) 散: 1回 1-2g 1日 2-3回  
(2) 湯

[効能・効果] 体力中等度以下で、腹部は力がなくて、神経過敏で胃痛又は腹痛があつて、ときに胸やけや、げっぷ、胃もたれ、食欲不振、はきけ、嘔吐などを伴うものの次の諸症:  
神経性胃炎、慢性胃炎、胃腸虚弱

2 胃風湯

[成分・分量] 当帰 2.5-3、芍薬 3、川芎 2.5-3、人参 3、白朮 3、茯苓 3-4、桂皮 2-3、粟 2-4

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以下で、顔色悪くて食欲なく、疲れやすいものの次の諸症:

急・慢性胃腸炎、冷えによる下痢

3 胃苓湯

[成分・分量] 蒼朮 2.5-3、厚朴 2.5-3、陳皮 2.5-3、猪苓 2.5-3、沢瀉 2.5-3、芍薬 2.5-3、白朮 2.5-3、茯苓 2.5-3、桂皮 2-2.5、大棗 1-3、生姜 1-2、甘草 1-2、縮砂 2、黃連 2 (芍薬、縮砂、黃連のない場合も可)

[用法・用量] (1) 散: 1回 1-2g 1日 3回  
(2) 湯

[効能・効果] 体力中等度で、水様性の下痢、嘔吐があり、口渴、尿量減少を伴うものの次の諸症:

食あたり、暑気あたり、冷え腹、急性胃腸炎、腹痛

4 茵陳蒿湯

[成分・分量] 茵陳蒿 4-14、山梔子 1.4-5、大黃 1-3

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以上で、口渴があり、尿量少なく、便秘するものの次の諸症:

じんましん、口内炎、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ

5 烏薬順氣散

〔成分・分量〕 麻黄 2.5-3、陳皮 2.5-5、烏薬 2.5-5、川芎 2-3、白彊蚕 1.5-2.5、枳殼 1.5-3、白芷 1.5-3、甘草 1-1.5、桔梗 2-3、乾姜 1-2.5、生姜 1、大棗 1-3（生姜・大棗を抜いても可）

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度のものの次の諸症：

しびれ、筋力の低下、四肢の痛み、肩こり

6 烏苓通氣散

〔成分・分量〕 烏薬 2-3.5、当帰 2-3.5、芍藥 2-3.5、香附子 2-3.5、山楂子 2-3.5、陳皮 2-3.5、茯苓 1-3、白朮 1-3、檳榔子 1-2、延胡索 1-2.5、沢瀉 1-2、木香 0.6-1、甘草 0.6-1、生姜 1（ヒネショウガを用いる場合 2）

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 下腹部の痛み、乳腺の痛み

《備考》 注） 体力に関わらず、使用できる。

【注） 表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
〈効能・効果に関する注意〉として記載する。】

7 溫經湯

〔成分・分量〕 半夏 3-5、麦門冬 3-10、当帰 2-3、川芎 2、芍藥 2、人参 2、桂皮 2、阿膠 2、牡丹皮 2、甘草 2、生姜 1、吳茱萸 1-3

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、手足がほてり、唇がかわくものの次の諸症：  
月経不順、月経困難、こしけ（おりもの）、更年期障害、不眠、  
神経症、湿疹・皮膚炎、足腰の冷え、しもやけ、手あれ（手の  
湿疹・皮膚炎）

8 溫清飲

〔成分・分量〕 当帰 3-4、地黃 3-4、芍藥 3-4、川芎 3-4、黃連 1-2、黃芩 1.5-3、  
山梔子 1.5-2、黃柏 1-1.5

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度で、皮膚はかさかさして色つやが悪く、のぼせるもの  
の次の諸症：

月経不順、月経困難、血の道症<sup>注)</sup>、更年期障害、神経症、湿疹・  
皮膚炎

《備考》 注） 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性  
のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精  
神神経症状および身体症状のことである。

【注） 表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
〈効能・効果に関する注意〉として記載する。】

9 溫胆湯

[成分・分量] 半夏 4-6、茯苓 4-6、生姜 1-2 (ヒネショウガを使用する場合 3)、陳皮 2-3、竹茹 2-3、枳実 1-2、甘草 1-2、黃連 1、酸棗仁 1-3、大棗 2 (黃連以降のない場合も可)

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以下で、胃腸が虚弱なものの次の諸症：  
不眠症、神経症

9 A 加味溫胆湯

[成分・分量] 半夏 3.5-6、茯苓 3-6、陳皮 2-3、竹茹 2-3、生姜 1-2、枳実 1-3、甘草 1-2、遠志 2-3、玄参 2 (五味子 3 に変えて可)、人参 2-3、地黄 2-3、酸棗仁 1-5、大棗 2、黃連 1-2 (黃連のない場合も可)  
(遠志、玄参、人参、地黄、大棗のない場合もある)

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以下で、胃腸が虚弱なものの次の諸症：  
神経症、不眠症

9 B 竹茹溫胆湯

[成分・分量] 柴胡 3-6、竹茹 3、茯苓 3、麥門冬 3-4、陳皮 2-3、枳実 1-3、黃連 1-4.5、甘草 1、半夏 3-5、香附子 2-2.5、生姜 1、桔梗 2-3、人参 1-2

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度のものの次の諸症：  
かぜ、インフルエンザ、肺炎などの回復期に熱が長びいたり、  
また平熱になっても、気分がさっぱりせず、せきやたんが多く  
て安眠が出来ないもの

10 越婢加朮湯

[成分・分量] 麻黄 4-6、石膏 8-10、生姜 1 (ヒネショウガを使用する場合 3)、大棗 3-5、甘草 1.5-2、白朮 3-4 (蒼朮も可)

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以上で、むくみがあり、のどが渴き、汗が出て、ときには尿量が減少するものの次の諸症：  
むくみ、関節のはれや痛み、関節炎、湿疹・皮膚炎、夜尿症、  
目のかゆみ・痛み

10 A 越婢加朮附湯

[成分・分量] 麻黄 4-6、石膏 8-10、白朮 3-4 (蒼朮も可)、加工ブシ 0.3-1、生姜 1 (ヒネショウガを使用する場合 3)、甘草 1.5-2、大棗 3-4

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以上で、冷えがあって、むくみがあり、のどが渴き、汗が出て、ときには尿量が減少するものの次の諸症：  
むくみ、関節のはれや痛み、筋肉痛、湿疹・皮膚炎、夜尿症、  
目のかゆみ・痛み

10B 桂枝越婢湯

[成分・分量] 桂皮4、芍薬4、甘草2、麻黃5、生姜1(ヒネショウガを使用する場合2.5)、大棗3、石膏8、蒼朮4、加工ブシ1

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以下のものの次の諸症：  
関節のはれや痛み

10C 桂枝二越婢一湯

[成分・分量] 桂皮2.5-3.5、芍薬2.5-3.5、麻黃2.5-3.5、甘草2.5-3.5、大棗3-4、石膏3-8、生姜1(ヒネショウガを使用する場合2.8-3.5)

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度で、のどが渴き、汗が出るもの次の諸症：  
感冒、頭痛、腰痛、筋肉痛、関節のはれや痛み

10D 桂枝二越婢一湯加朮附

[成分・分量] 桂皮2.5、芍薬2.5、甘草2.5、麻黃2.5、生姜1(ヒネショウガを使用する場合3.5)、大棗3、石膏3、白朮3(蒼朮も可)、加工ブシ0.5-1

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以下で、冷えがあって、のどが渴き、汗が出て、ときに尿量が減少するものの次の諸症：  
関節のはれや痛み、筋肉痛、腰痛、頭痛

11 延年半夏湯

[成分・分量] 半夏3-5、柴胡2-5、別甲2-5、桔梗2-4、檳榔子2-4、人参0.8-2、生姜1-2、枳実0.5-2、吳茱萸0.5-2

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度で、みぞおちに抵抗感があって、肩がこり、足が冷えるものの次の諸症：  
慢性胃炎、胃痛、食欲不振

12 黃芩湯

[成分・分量] 黃芩4-9、芍薬2-8、甘草2-6、大棗4-9

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度で、腹痛、みぞおちのつかえがあり、ときにさむけ、発熱などがあるものの次の諸症：  
下痢、胃腸炎

1 3 応鐘散（芎黃散）

[成分・分量] 大黄 1、川芎 2

[用法・用量] (1) 散：1回に頓用する。

(2) 湯：上記量を 1 日量

[効能・効果] 体力中等度以上のものの次の諸症：

便秘、便秘に伴うのぼせ・肩こり

1 4 黃連阿膠湯

[成分・分量] 黃連 3-4、芍藥 2-2.5、黃芩 1-2、阿膠 3、卵黃 1 個

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以下で、冷えやすくのぼせ気味で胸苦しく不眠の傾向のあるものの次の諸症：

鼻血、不眠症、かさかさした湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ

1 5 黃連解毒湯

[成分・分量] 黃連 1.5-2、黃芩 3、黃柏 1.5-3、山梔子 2-3

[用法・用量] (1) 散：1回 1.5-2g 1 日 3 回

(2) 湯

[効能・効果] 体力中等度以上で、のぼせぎみで顔色赤く、いらいらして落ち着かない傾向のあるものの次の諸症：

鼻出血、不眠症、神經症、胃炎、二日酔、血の道症<sup>注)</sup>、めまい、動悸、更年期障害、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ、口内炎

《備考》  
注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神經症状および身体症状のことである。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
(効能・効果に関する注意)として記載する。】

1 6 黃連湯

[成分・分量] 黃連 3、甘草 3、乾姜 3、人参 2-3、桂皮 3、大棗 3、半夏 5-8

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度で、胃部の停滞感や重圧感、食欲不振があり、ときにはきけや嘔吐のあるものの次の諸症：

胃痛、急性胃炎、二日酔、口内炎

1 7 乙字湯

[成分・分量] 当帰 4-6、柴胡 4-6、黃芩 3-4、甘草 1.5-3、升麻 1-2、大黃 0.5-3

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以上で、大便がかたく、便秘傾向のあるものの次の諸症：

痔核(いぼ痔)、きれ痔、便秘、軽度の脱肛

17A 乙字湯去大黃

[成分・分量] 当帰 4-6、柴胡 4-6、黃芩 3-4、甘草 1.5-3、升麻 1-2

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度又はやや虚弱なものの次の諸症：  
痔核（いぼ痔）、きれ痔、軽度の脱肛

18 解急蜀椒湯

[成分・分量] 蜀椒 1-2、加工ブシ 0.3-1、粳米 7-8、乾姜 1.5-4、半夏 4-8、  
大棗 3、甘草 1-2、人参 2-3、膠飴 20（膠飴はなくても可）

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以下で、腹部が冷えて痛み、あるいは腹が張って、  
ときに嘔吐を伴うものの次の諸症：  
冷え腹、急性胃腸炎、腹痛

19 加減涼膈散（浅田）

[成分・分量] 連翹 3、黃芩 3、山梔子 3、桔梗 3、薄荷 2、甘草 1、大黃 1、  
石膏 10

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以上で、胃腸の調子がすぐれないものの次の諸症：  
口内炎、口の中の炎症

20 加減涼膈散（龔廷賢）

[成分・分量] 連翹 2-3、黃芩 2-3、山梔子 1.5-3、桔梗 2-3、黃連 1-2、薄荷  
1-2、当帰 2-4、地黃 2-4、枳実 1-3、芍藥 2-4、甘草 1-1.5

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度で、胃腸の調子がすぐれないものの次の諸症：  
口内炎、口の中の炎症

21 薦香正氣散

[成分・分量] 白朮 3、茯苓 3-4、陳皮 2-3、白芷 1-4、薑香 1-4、大棗 1-3、甘  
草 1-1.5、半夏 3、厚朴 2-3、桔梗 1.5-3、蘇葉 1-4、大腹皮 1-4、  
生姜 1

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以下のものの次の諸症：  
感冒、暑さによる食欲不振、急性胃腸炎、下痢、全身倦怠

22 葛根黃連黃芩湯

[成分・分量] 葛根 5-6、黃連 3、黃芩 3、甘草 2

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度のものの次の諸症：  
下痢、急性胃腸炎、口内炎、舌炎、肩こり、不眠

### 2 3 葛根紅花湯

[成分・分量] 葛根 3、芍薬 3、地黃 3、黃連 1.5、山梔子 1.5、紅花 1.5、大黃 1、甘草 1

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以上で、便秘傾向のものの次の諸症：  
あかはな（酒さ）、じみ

### 2 4 葛根湯

[成分・分量] 葛根 4-8、麻黃 3-4、大棗 3-4、桂皮 2-3、芍薬 2-3、甘草 2、生姜 1-1.5

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以上のものの次の諸症：  
感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

### 2 4 A 葛根湯加川芎辛夷

[成分・分量] 葛根 4-8、麻黃 3-4、大棗 3-4、桂皮 2-3、芍薬 2-3、甘草 2、生姜 1-1.5、川芎 2-3、辛夷 2-3

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 比較的体力があるものの次の諸症：  
鼻づまり、蓄膿症（副鼻腔炎）、慢性鼻炎

### 2 4 B 独活葛根湯

[成分・分量] 葛根 5、桂皮 3、芍薬 3、麻黃 2、獨活 2、生姜 0.5-1（ヒネショウガを使用する場合 1-2）、地黃 4、大棗 1-2、甘草 1-2

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度又はやや虚弱なものの次の諸症：  
四十肩、五十肩、寝ちがえ、肩こり

### 2 5 加味解毒湯

[成分・分量] 黃連 2、黃芩 2、黃柏 2、山梔子 2、柴胡 2、茵陳蒿 2、竜胆 2、木通 2、滑石 3、升麻 1.5、甘草 1.5、燈心草 1.5、大黃 1.5  
(大黃のない場合も可)

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 比較的体力があり、血色がよいものの次の諸症：  
小便がしづって出にくいもの、痔疾（いぼ痔、痔痛、痔出血）

26 桂樓薤白白酒湯

〔成分・分量〕 桂樓実 2-5 (桂樓仁も可)、薤白 4-9.6、白酒 140-700 (日本酒も可)

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 背部にひびく胸部・みぞおちの痛み、胸部の圧迫感

〔備考〕 注) 体力に関わらず、使用できる。

〔注〕 表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

26A 桂樓薤白湯

〔成分・分量〕 桂樓仁 2、薤白 10、十薬 6、甘草 2、桂皮 4、防已 4

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 背部にひびく胸部・みぞおちの痛み、胸部の圧迫感

〔備考〕 注) 体力に関わらず、使用できる。

〔注〕 表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

27 乾姜人参半夏丸

〔成分・分量〕 乾姜 3、人参 3、半夏 6

〔用法・用量〕 (1) 散 : 1回 1.5-5g 1日 3回

(2) 湯 : 上記量を 1 日量とする。

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、はきけ・嘔吐が続きみぞおちのつかえを感じるもの次の諸症 :

つわり、胃炎、胃腸虚弱

28 甘草乾姜湯

〔成分・分量〕 甘草 4-8、乾姜 2-4

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力虚弱で、手足が冷え、薄い唾液が口に溜まるものの次の諸症 :

頻尿、尿もれ、唾液分泌過多、鼻炎、しゃっくり、めまい

29 甘草湯

〔成分・分量〕 甘草 2-8

〔用法・用量〕 (1) 散 : 1回 0.5g 1日 2回

(2) 湯 : 少しづつゆっくり飲む。

(3) 外用 : 煎液で患部を温湿布する。

〔効能・効果〕 激しいせき、咽喉痛、口内炎、しづがれ声

外用 : 痒・脱肛の痛み

〔備考〕 注) 体力に関わらず、使用できる。

〔注〕 表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

3 0 甘草附子湯

[成分・分量] 甘草 2-3、加工ブシ 0.5-2、白朮 2-6、桂皮 3-4

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力虚弱で、痛みを伴うものの次の諸症：  
関節のはれや痛み、神経痛、感冒

3 1 甘麦大棗湯

[成分・分量] 甘草 3-5、大棗 2.5-6、小麦 14-20

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以下で、神経が過敏で、驚きやすく、ときにあくびが出るもの次の諸症：  
不眠症、小児の夜泣き、ひきつけ

3 2 甘露飲

[成分・分量] 熟地黄 2-3、乾地黄 2-2.5、麦門冬 2-3、枳実 1-2.5、甘草 2-2.5、茵陳蒿 2-2.5、枇杷葉 2-2.5、石斛 2-2.5、黃芩 2-3、天門冬 2-3

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以下のものの次の諸症：  
口内炎、舌の荒れや痛み、歯周炎

3 3 桔梗湯

[成分・分量] 桔梗 1-4、甘草 2-8

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力に関わらず使用でき、のどがはれて痛み、ときにせきができるものの次の諸症：  
扁桃炎、扁桃周囲炎

3 4 帰脾湯

[成分・分量] 人参 2-4、白朮 2-4 (蒼朮も可)、茯苓 2-4、酸棗仁 2-4、竜眼肉 2-4、黃耆 2-4、当帰 2、遠志 1-2、甘草 1、木香 1、大棗 1-2、生姜 1-1.5

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以下で、心身が疲れ、血色が悪いものの次の諸症：  
貧血、不眠症、神経症、精神不安

3 4 A 加味帰脾湯

[成分・分量] 人参 3、白朮 3 (蒼朮も可)、茯苓 3、酸棗仁 3、竜眼肉 3、黃耆 2-3、当帰 2、遠志 1-2、柴胡 2.5-3、山梔子 2-2.5、甘草 1、木香 1、大棗 1-2、生姜 1-1.5、牡丹皮 2 (牡丹皮はなくても可)

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以下で、心身が疲れ、血色が悪く、ときに熱感を伴うものの次の諸症：  
貧血、不眠症、精神不安、神経症

### 3 5 菖帰調血飲

〔成分・分量〕 当帰 2-2.5、地黄 2-2.5、川芎 2-2.5、白朮 2-2.5（蒼朮也可）、茯苓 2-2.5、陳皮 2-2.5、烏藥 2-2.5、大棗 1-1.5、香附子 2-2.5、甘草 1、牡丹皮 2-2.5、益母草 1-1.5、乾姜 1-1.5、生姜 0.5-1.5（生姜はなくても可）

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下のものの次の諸症。ただし産後の場合は体力に関わらず使用できる。  
月経不順、産後の神經症・体力低下

### 3 5 A 菖帰調血飲第一加減

〔成分・分量〕 当帰 2、川芎 2、地黄 2、白朮 2（蒼朮也可）、茯苓 2、陳皮 2、烏藥 2、香附子 2、牡丹皮 2、益母草 1.5、大棗 1.5、甘草 1、乾姜 1-1.5、生姜 0.5-1.5（生姜はなくても可）、芍藥 1.5、桃仁 1.5、紅花 1.5、枳實 1.5、桂皮 1.5、牛膝 1.5、木香 1.5、延胡索 1.5

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下のものの次の諸症。ただし産後の場合は体力に関わらず使用できる。  
血の道症<sup>注)</sup>、月経不順、産後の体力低下

#### 《備考》

注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神經症状および身体症状のことである。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

### 3 6 響声破笛丸

〔成分・分量〕 連翹 2.5、桔梗 2.5、甘草 2.5、大黃 1、縮砂 1、川芎 1、訶子 1、阿仙藥 2、薄荷葉 4（大黃のない場合也可）

〔用法・用量〕 (1) 散：1回 2-3g 1日数回  
(2) 湯

〔効能・効果〕 しわがれ声、咽喉不快

《備考》 注) 体力に関わらず、使用できる。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

### 3 7 杏蘇散

〔成分・分量〕 蘇葉 3、五味子 2、大腹皮 2、烏梅 2、杏仁 2、陳皮 1-1.5、桔梗 1-1.5、麻黃 1-1.5、桑白皮 1-1.5、阿膠 1-1.5、甘草 1-1.5、紫苑 1

〔用法・用量〕 湯（原則として）

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、気分がすぐれず、汗がなく、ときに顔がむくものの次の諸症：  
せき、たん、気管支炎

3 8 苦参湯

[成分・分量] 苦参 6-10

[用法・用量] 水 500-600mL で煮て 250-300mL とし外用する。

[効能・効果] ただれ、あせも、かゆみ

3 9 駆風解毒散（湯）

[成分・分量] 防風 3-5、牛蒡子 3、連翹 5、荊芥 1.5、羌活 1.5、甘草 1.5、桔梗 3、石膏 5-10

[用法・用量] 湯（本処方は熱ければ冷ましてうがいしながら少しづつ呑くなり飲む）

[効能・効果] 体力に関わらず使用でき、のどがはれて痛むものの次の諸症：扁桃炎、扁桃周囲炎

4 0 九味欒榔湯

[成分・分量] 欒榔子 4、厚朴 3、桂皮 3、橘皮 3、蘇葉 1-2、甘草 1、大黃 0.5-1、木香 1、生姜 1（ヒネショウガを使用する場合 3）（大黃を去り、吳茱萸 1、茯苓 3 を加えても可）

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以上で、全身倦怠感があり、とくに下肢の倦怠感が著しいものの次の諸症：  
疲労倦怠感、更年期障害、動悸、息切れ、むくみ、神経症、胃腸炎、関節のはれや痛み

4 1 荊芥連翹湯

[成分・分量] 当帰 1.5、芍薬 1.5、川芎 1.5、地黃 1.5、黃連 1.5、黃芩 1.5、黃柏 1.5、山梔子 1.5、連翹 1.5、荊芥 1.5、防風 1.5、薄荷葉 1.5、枳殼（実） 1.5、甘草 1-1.5、白芷 1.5-2.5、桔梗 1.5-2.5、柴胡 1.5-2.5（地黃、黃連、黃柏、薄荷葉のない場合も可）

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以上で、皮膚の色が浅黒く、ときに手足の裏に脂汗をかきやすく腹壁が緊張しているものの次の諸症：  
蓄膿症（副鼻腔炎）、慢性鼻炎、慢性扁桃炎、にきび

4 2 鶏肝丸

[成分・分量] 鶏肝 1 具

鶏肝 1 具をとりゆでて乾燥し、山藥末（鶏肝の乾燥した量の 2-3 倍量をめやすとする。）を和しつつ細末とし糊丸とする。

[用法・用量] 丸：1 回 2g 1 日 3 回

[効能・効果] 体力虚弱なものの次の症状：  
虚弱体質

#### 4 3 桂姜棗草黃辛附湯

〔成分・分量〕桂皮3、生姜1(ヒネショウガを使用する場合3)、甘草2、大棗3-3.5、麻黃2、細辛2、加工ブシ0.3-1

〔用法・用量〕湯

〔効能・効果〕体力中等度以下で、さむけを訴えるものの次の諸症：  
感冒、気管支炎、関節のはれや痛み、水様性鼻汁を伴う鼻炎、  
神經痛、腰痛、冷え症

#### 4 4 桂枝加黃耆湯

〔成分・分量〕桂皮3-4、芍薬3-4、大棗3-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、甘草2、黃耆2-3

〔用法・用量〕湯

〔効能・効果〕体力虚弱なものの次の諸症：  
ねあせ、あせも、湿疹・皮膚炎

#### 4 4 A 黃耆桂枝五物湯

〔成分・分量〕黃耆3、芍薬3、桂皮3、生姜1.5-2(ヒネショウガを使用する場合5-6)、大棗3-4

〔用法・用量〕湯

〔効能・効果〕体力中等度以下のものの次の諸症：  
身体や四肢のしびれ、顔面・口腔内のしびれ、湿疹・皮膚炎

#### 4 5 桂枝加芍薬湯

〔成分・分量〕桂皮3-4、芍薬6、大棗3-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、甘草2

〔用法・用量〕湯

〔効能・効果〕体力中等度以下で、腹部膨満感のあるものの次の諸症：  
しぶり腹<sup>注)</sup>、腹痛、下痢、便秘

《備考》注) しぶり腹とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すもののことである。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

#### 4 5 A 桂枝加芍薬生姜人参湯

〔成分・分量〕桂皮2.4-4、大棗2.4-4、芍薬3.2-6、生姜1-2(ヒネショウガを使用する場合4-5.5)、甘草1.6-2、人参2.4-4.5

〔用法・用量〕湯

〔効能・効果〕体力虚弱なものの次の諸症：  
みぞおちのつかえ、腹痛、手足の痛み

#### 4 5 B 桂枝加芍薬大黃湯

[成分・分量] 桂皮 3-4、芍薬 4-6、大棗 3-4、生姜 1-1.5 (ヒネショウガを使用する場合 3-4)、甘草 2、大黃 1-2

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以下で、腹部膨満感、腹痛があり、便秘するものの次の諸症：

便秘、しづり腹<sup>注)</sup>

《備考》 注) しづり腹とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すもののことである。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
(効能・効果に関連する注意)として記載する。】

#### 4 6 桂枝加朮附湯

[成分・分量] 桂皮 3-4、芍薬 3-4、大棗 3-4、生姜 1-1.5 (ヒネショウガを使用する場合 3-4)、甘草 2、蒼朮 3-4 (白朮も可)、加工ブシ 0.5-1

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力虚弱で、汗が出、手足が冷えてこわばり、ときに尿量が少ないものの次の諸症：

関節痛、神経痛

#### 4 6 A 桂枝加苓朮附湯

[成分・分量] 桂皮 3-4、芍薬 3-4、大棗 3-4、生姜 1-1.5 (ヒネショウガを使用する場合 3-4)、甘草 2、蒼朮 3-4 (白朮も可)、加工ブシ 0.5-1、茯苓 4

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力虚弱で、手足が冷えてこわばり、尿量が少なく、ときに動悸、めまい、筋肉のびくつきがあるものの次の諸症：  
関節痛、神経痛

#### 4 7 桂枝加竜骨牡蠣湯

[成分・分量] 桂皮 3-4、芍薬 3-4、大棗 3-4、生姜 1-1.5 (ヒネショウガを使用する場合 3-4)、甘草 2、竜骨 3、牡蠣 3

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以下で、疲れやすく、神経過敏で、興奮しやすいものの次の諸症：

神経質、不眠症、小児夜泣き、夜尿症、眼精疲労、神経症

#### 4 8 桂枝芍薬知母湯

[成分・分量] 桂皮 3-4、芍薬 3-4、甘草 1.5-2、麻黃 2-3、生姜 1-2 (ヒネショウガを使用する場合 3-5)、白朮 4-5 (蒼朮も可)、知母 2-4、防風 3-4、加工ブシ 0.3-1

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力虚弱で、皮膚が乾燥し、四肢あるいは諸関節のはれが慢性に経過して、痛むものの次の諸症：  
関節のはれや痛み、関節炎、神経痛

4 9 桂枝湯

[成分・分量] 桂皮 3-4、芍薬 3-4、大棗 3-4、生姜 1-1.5 (ヒネショウガを使用する場合 3-4)、甘草 2

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力虚弱で、汗が出るもの次の症状：  
かぜの初期

4 9 A 桂枝加葛根湯

[成分・分量] 桂皮 2.4-4、芍薬 2.4-4、大棗 2.4-4、生姜 1-1.5 (ヒネショウガを使用する場合 2.4-4)、甘草 1.6-2、葛根 3.2-6

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以下で、汗が出て、肩こりや頭痛のあるもの次の症状：  
かぜの初期

4 9 B 桂枝加厚朴杏仁湯

[成分・分量] 桂皮 2.4-4、芍薬 2.4-4、大棗 2.4-4、生姜 1-1.5 (ヒネショウガを使用する場合 3-4)、甘草 1.6-2、厚朴 1-4、杏仁 1.6-4

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力虚弱なものの次の諸症：  
せき、気管支炎、気管支ぜんそく

5 0 桂枝茯苓丸

[成分・分量] 桂皮 3-4、茯苓 4、牡丹皮 3-4、桃仁 4、芍薬 4

[用法・用量] (1) 散：1回 2-3g 1日 3回

(2) 湯

[効能・効果] 比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症：  
月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症<sup>注)</sup>、肩こり、めまい、頭重、打ち身(打撲症)、しもやけ、しみ、湿疹・皮膚炎、にきび

《備考》  
注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
<効能・効果に関連する注意>として記載する。】

### 50A 桂枝茯苓丸料加薏苡仁

[成分・分量] 桂皮 3-4、茯苓 4、牡丹皮 3-4、桃仁 4、芍藥 4、薏苡仁 10-20

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症：

にきび、しみ、手足のあれ（手足の湿疹・皮膚炎）、月経不順、血の道症<sup>注)</sup>

#### 《備考》

注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

【注）表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

### 50B 甲子湯

[成分・分量] 桂皮 3-4、茯苓 3-4、牡丹皮 3-4、桃仁 3-4、芍藥 3-4、甘草 1.5、生姜 1-1.5（ヒネショウガを使用する場合 3）

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症：

月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症<sup>注)</sup>、肩こり、めまい、頭重、打ち身（打撲症）、しもやけ、しみ

#### 《備考》

注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

【注）表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

### 51 啓脾湯

[成分・分量] 人参 3、白朮 3-4（蒼朮也可）、茯苓 3-4、蓮肉 3、山茱萸 3、山楂子 2、陳皮 2、沢瀉 2、大棗 1、生姜 1（ヒネショウガを使用する場合 3）、甘草 1（大棗、生姜はなくても可）

[用法・用量] (1) 散：1回 1-2g 1日 3回

(2) 湯

[効能・効果] 体力虚弱で、痩せて顔色が悪く、食欲がなく、下痢の傾向があるものの次の諸症：

胃腸虚弱、慢性胃腸炎、消化不良、下痢

### 52 荊防敗毒散

[成分・分量] 荆芥 1.5-2、防風 1.5-2、羌活 1.5-2、独活 1.5-2、柴胡 1.5-2、薄荷葉 1.5-2、連翹 1.5-2、桔梗 1.5-2、枳殼（又は枳実）1.5-2、川芎 1.5-2、前胡 1.5-2、金銀花 1.5-2、甘草 1-1.5、生姜 1

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 比較的体力があるものの次の諸症：  
急性化膿性皮膚疾患の初期、湿疹・皮膚炎

5 3 桂麻各半湯

[成分・分量] 桂皮 3.5、芍薬 2、生姜 0.5-1 (ヒネショウガを使用する場合 2)、甘草 2、麻黄 2、大棗 2、杏仁 2.5

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度又はやや虚弱なものの次の諸症：  
感冒、せき、かゆみ

5 4 鷄鳴散加茯苓

[成分・分量] 檳榔子 3-4、木瓜 3、橘皮 2-3、桔梗 2-3、茯苓 4-6、吳茱萸 1-1.5、蘇葉 1-2、生姜 1-1.5 (ヒネショウガを使用する場合 3)

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度のものの次の諸症：  
下肢の倦怠感、ふくらはぎの緊張・圧痛

5 5 外台四物湯加味

[成分・分量] 桔梗 3、紫苑 1.5、甘草 2、麥門冬 9、人参 1.5、貝母 2.5、杏仁 4.5

[用法・用量] 湯

[効能・効果] のどが痛くて声が出ない感冒

《備考》 注) 体力に関わらず、使用できる。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

5 6 堅中湯

[成分・分量] 半夏 5、茯苓 5、桂皮 4、大棗 3、芍薬 3、乾姜 3 (生姜 1 でも可)、甘草 1-1.5

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力虚弱で、ときに胃部に水がたまる感じのするものの次の諸症：  
慢性胃炎、腹痛

5 7 香砂養胃湯

[成分・分量] 白朮 2.5-3、茯苓 2.5-3、蒼朮 2、厚朴 2-2.5、陳皮 2-2.5、香附子 2-2.5、白豆蔻 2 (小豆蔻代用可)、人参 1.5-2、木香 1.5、縮砂 1.5-2.5、甘草 1.5-2.5、大棗 1.5-2.5、生姜 0.7-1

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力虚弱なものの次の諸症：  
胃弱、胃腸虚弱、慢性胃腸炎、食欲不振

5 8 香蘇散

[成分・分量] 香附子 3.5-4.5、蘇葉 1-3、陳皮 2-3、甘草 1-1.5、生姜 1-2

[用法・用量] (1) 散 : 1回 1-2g 1日 3回

(2) 湯

[効能・効果] 体力虚弱で、神経過敏で気分がすぐれず胃腸の弱いものの次の諸症 :

かぜの初期、血の道症<sup>注)</sup>

《備考》 注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

5 9 厚朴生姜半夏人参甘草湯

[成分・分量] 厚朴 3、ヒネショウガ 3 (生姜を使用する場合 1)、半夏 4、人参 1.5、甘草 2.5

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力虚弱で、腹部膨満感のあるものの次の諸症 :  
胃腸虚弱、嘔吐

6 0 牛膝散

[成分・分量] 牛膝 3、桂皮 3、芍薬 3、桃仁 3、当帰 3、牡丹皮 3、延胡索 3、木香 1

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 比較的体力があるものの次の諸症 :  
月経困難、月経不順、月経痛

6 1 五積散

[成分・分量] 茯苓 2-3、蒼朮 2-3 (白朮も可)、陳皮 2-3、半夏 2-3、当帰 1.2-3、芍薬 1-3、川芎 1-3、厚朴 1-3、白芷 1-3、枳殼 (実) 1-3、桔梗 1-3、乾姜 1-1.5、生姜 0.3-0.6 (ヒネショウガを使用する場合 1-2)、桂皮 1-1.5、麻黃 1-2.5、大棗 1-2、甘草 1-1.2、香附子 1.2 (生姜、香附子のない場合も可)

[用法・用量] 湯 (原則として)

[効能・効果] 体力中等度又はやや虚弱で、冷えがあるものの次の諸症 :  
胃腸炎、腰痛、神経痛、関節痛、月経痛、頭痛、更年期障害、感冒

6 2 吳茱萸湯

[成分・分量] 吳茱萸 3-4、大棗 2-4、人参 2-3、生姜 1-2 (ヒネショウガを使用する場合 4-6)

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以下で、手足が冷えて肩がこり、ときにみぞおちが膨満するものの次の諸症 :  
頭痛、頭痛に伴うはきけ・嘔吐、しゃっくり

### 6 3 五物解毒散

〔成分・分量〕 川芎 5、金銀花 2、十葉 2、大黃 1、荊芥 1.5

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以上のものの次の諸症：  
かゆみ、湿疹・皮膚炎

### 6 4 五淋散

〔成分・分量〕 茯苓 5-6、当帰 3、黃芩 3、甘草 3、芍藥 1-2、山梔子 1-2、地黃 3、沢瀉 3、木通 3、滑石 3、車前子 3 (地黃以下のない場合も可)

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度のものの次の諸症：  
頻尿、排尿痛、残尿感、尿のにごり

### 6 5 五苓散

〔成分・分量〕 沢瀉 4-6、猪苓 3-4.5、茯苓 3-4.5、蒼朮 3-4.5 (白朮も可)、桂皮 2-3

〔用法・用量〕 (1) 散：1回 1-2g 1日 3回  
(2) 湯

〔効能・効果〕 体力に関わらず使用でき、のどが渴いて尿量が少ないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症：

水様性下痢、急性胃腸炎 (しぶり腹<sup>注</sup>) のものには使用しないこと)、暑気あたり、頭痛、むくみ、二日酔

《備考》 注 しぶり腹とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すもののことである。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
〈効能・効果に関する注意〉として記載する。】

### 6 5 A 茵陳五苓散

〔成分・分量〕 沢瀉 4.5-6、茯苓 3-4.5、猪苓 3-4.5、蒼朮 3-4.5 (白朮も可)、桂皮 2-3、茵陳蒿 3-4

〔用法・用量〕 (1) 散：散の場合は茵陳五苓散のうち茵陳蒿を除いた他の生薬を湯の場合の 1/8 量を用いるか、茵陳五苓散のうち茵陳蒿を除いた他の生薬の合計が茵陳蒿の半量となるように用いる。(1回 1-2g 1日 3回)

(2) 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以上をめやすとして、のどが渴いて、尿量が少ないものの次の諸症：  
嘔吐、じんましん、二日酔、むくみ

### 6 5 B 四苓湯

〔成分・分量〕 沢瀉 4、茯苓 4、蒼朮 4 (白朮も可)、猪苓 4

〔用法・用量〕 (1) 散：1回 1-1.5g 1日 2-3回  
(2) 湯

〔効能・効果〕 体力に関わらず使用でき、のどが渴いて水を飲んでも尿量が少なく、はきけ、嘔吐、腹痛、むくみなどのいずれかを伴うものの次の諸症：

暑気あたり、急性胃腸炎、むくみ

## 6 6 柴葛解肌湯

[成分・分量] 柴胡 3-5、葛根 2.5-4、麻黄 2-3、桂皮 2-3、黃芩 2-3、芍藥 2-3、半夏 2-4、生姜 1 (ヒネショウガを使用する場合 1-2)、甘草 1-2、石膏 4-8

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以上で、激しい感冒様症状を示すものの次の諸症：  
発熱、悪寒、頭痛、四肢の痛み、口渴、不眠、鼻腔乾燥、食欲不振、はきけ、全身倦怠

## 6 6 A 柴葛湯加川芎辛夷

[成分・分量] 柴胡 6、半夏 3.5、黃芩 3、桂皮 5、芍藥 3、葛根 6、麻黄 2、竹節人参 2、甘草 1、大棗 1.2、生姜 2.5、川芎 3、辛夷 2

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以上のものの次の諸症：  
慢性に経過した鼻炎、蓄膿症（副鼻腔炎）

## 6 7 柴梗半夏湯

[成分・分量] 柴胡 4、半夏 4、桔梗 2-3、杏仁 2-3、栝樓仁 2-3、黃芩 2.5、大棗 2.5、枳実 1.5-2、青皮 1.5-2、甘草 1-1.5、生姜 1.5 (ヒネショウガを使用する場合 2.5)

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以上で、かぜがこじれたものの次の症状：  
腹にひびく強度のせき

## 6 8 柴胡加竜骨牡蠣湯

[成分・分量] 柴胡 5、半夏 4、茯苓 3、桂皮 3、大棗 2.5、人参 2.5、竜骨 2.5、牡蠣 2.5、生姜 0.5-1、大黃 1、黃芩 2.5、甘草 2 以内（大黃、黃芩、甘草のない場合も可）

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以上で、精神不安があって、動悸、不眠、便秘などを伴う次の諸症：  
高血圧の随伴症状（動悸、不安、不眠）、神経症、更年期神経症、小児夜泣き、便秘

## 6 9 柴胡枳桔湯

[成分・分量] 柴胡 4-5、半夏 4-5、生姜 1 (ヒネショウガを使用する場合 3)、黃芩 3、栝樓仁 3、桔梗 3、甘草 1-2、枳実 1.5-2

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以上のものの次の諸症：  
せき、たん

## 70 柴胡桂枝乾姜湯

〔成分・分量〕 柴胡 6-8、桂皮 3、桔梗根 3-4、黃芩 3、牡蠣 3、乾姜 2、甘草 2

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、冷え症、貧血気味、神経過敏で、動悸、息切れ、ときにねあせ、頭部の発汗、口の乾きがあるものの次の諸症：

更年期障害、血の道症<sup>(注)</sup>、不眠症、神経症、動悸、息切れ、かぜの後期の症状、気管支炎

《備考》 注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

## 71 柴胡桂枝湯

〔成分・分量〕 柴胡 4-5、半夏 4、桂皮 1.5-2.5、芍薬 1.5-2.5、黃芩 1.5-2、人参 1.5-2、大棗 1.5-2、甘草 1-1.5、生姜 1 (ヒネショウガを使用する場合 2)

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度又はやや虚弱で、多くは腹痛を伴い、ときに微熱・寒気・頭痛・はきけなどのあるものの次の諸症：  
胃腸炎、かぜの中期から後期の症状

## 72 柴胡清肝湯

〔成分・分量〕 湯：柴胡 2、当帰 1.5、芍薬 1.5、川芎 1.5、地黃 1.5、黃連 1.5、黃芩 1.5、黃柏 1.5、山梔子 1.5、連翹 1.5、桔梗 1.5、牛蒡子 1.5、桔梗根 1.5、薄荷葉 1.5、甘草 1.5  
散：柴胡 2、当帰 1.5-2.5、芍薬 1.5-2.5、川芎 1.5-2.5、地黃 1.5-2.5、黃連 1.5、黃芩 1.5、黃柏 1.5、山梔子 1.5、連翹 1.5-2.5、桔梗 1.5-2.5、牛蒡子 1.5-2.5、桔梗根 1.5-2.5、薄荷葉 1.5-2.5、甘草 1.5-2.5

〔用法・用量〕 (1) 散：1回 2g 1日 3回

(2) 湯

〔効能・効果〕 体力中等度で、疳の強い傾向（神経過敏）にあるものの次の諸症：  
神經症、慢性扁桃炎、湿疹・皮膚炎、虚弱児の体质改善

## 73 柴朴湯

〔成分・分量〕 柴胡 7、半夏 5-8、生姜 1-2 (ヒネショウガを使用する場合 3-4)、黃芩 3、大棗 3、人参 3、甘草 2、茯苓 4-5、厚朴 3、蘇葉 2-3

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度で、気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、かぜをひきやすく、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴うものの次の諸症：

小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎、せき、不安神経症、虚弱体质

#### 74 柴苓湯

[成分・分量] 柴胡 4-7、半夏 4-5、生姜 1 (ヒネショウガを使用する場合 3-4)、  
黄芩 2.5-3、大棗 2.5-3、人参 2.5-3、甘草 2-2.5、沢瀉 4-6、  
猪苓 2.5-4.5、茯苓 2.5-4.5、白朮 2.5-4.5 (蒼朮も可)、桂皮  
2-3

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度で、のどが渴いて尿量が少なく、ときにはきけ、食欲不振、むくみなどを伴うものの次の諸症：  
水様性下痢、急性胃腸炎、暑気あたり、むくみ

#### 75 左突膏

[成分・分量] 松脂 800、黃蠅 220、豚脂 58、ゴマ油 1,000

[用法・用量] 外用

[効能・効果] 化膿性のはれもの

#### 76 三黃瀉心湯

[成分・分量] 大黃 1-5、黃芩 1-4、黃連 1-4

[用法・用量] 湯 (振り出しの場合 1/3 量を用いる)

[効能・効果] 体力中等度以上で、のぼせ気味で顔面紅潮し、精神不安、みぞおちのつかえ、便秘傾向などのあるものの次の諸症：  
高血圧の随伴症状 (のぼせ、肩こり、耳なり、頭重、不眠、不安)、鼻血、痔出血、便秘、更年期障害、血の道症注)

《備考》 注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
(効能・効果に関連する注意)として記載する。】

#### 76 A 三黃散

[成分・分量] 大黃 1-2、黃芩 1、黃連 1

[用法・用量] 散 : 1回 0.8g 1日 3回

[効能・効果] 体力中等度以上で、のぼせ気味で顔面紅潮し、精神不安、みぞおちのつかえ、便秘傾向などのあるものの次の諸症：  
高血圧の随伴症状 (のぼせ、肩こり、耳なり、頭重、不眠、不安)、鼻血、痔出血、便秘、更年期障害、血の道症注)

《備考》 注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
(効能・効果に関連する注意)として記載する。】

77 酸棗仁湯

[成分・分量] 酸棗仁 10-18、知母 2-3、川芎 2-3、茯苓 2-5、甘草 1

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以下で、心身が疲れ、精神不安、不眠などがあるものの次の諸症：

不眠症、神経症

78 三物黃芩湯

[成分・分量] 黃芩 1.5-3、苦參 3、地黃 6

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度又はやや虚弱で、手足のほてりがあるものの次の諸症：

湿疹・皮膚炎、手足のあれ（手足の湿疹・皮膚炎）、不眠

79 滋陰降火湯

[成分・分量] 当帰 2.5、芍藥 2.5、地黃 2.5、天門冬 2.5、麥門冬 2.5、陳皮 2.5、白朮あるいは蒼朮 3、知母 1-1.5、黃柏 1-1.5、甘草 1-1.5、大棗 1、生姜 1（大棗、生姜はなくても可）

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力虚弱で、のどにうるおいがなく、たんが切れにくくてせきこみ、皮膚が浅黒く乾燥し、便秘傾向のあるものの次の諸症：気管支炎、せき

80 滋陰至宝湯

[成分・分量] 当帰 2-3、芍藥 2-3、白朮あるいは蒼朮 2-3、茯苓 2-3、陳皮 2-3、柴胡 1-3、知母 2-3、香附子 2-3、地骨皮 2-3、麥門冬 2-3、貝母 1-2、薄荷葉 1、甘草 1

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力虚弱などの次の諸症：  
慢性のせき、たん、気管支炎

81 紫雲膏

[成分・分量] 紫根 100-120、当帰 60-100、豚脂 20-30、黃蠅 300-400、ゴマ油 1,000

[用法・用量] 外用

[効能・効果] ひび、あかぎれ、しもやけ、魚の目、あせも、ただれ、外傷、火傷、痔核による疼痛、肛門裂傷、湿疹・皮膚炎

82 四逆散

[成分・分量] 柴胡 2-5、芍藥 2-4、枳実 2、甘草 1-2

[用法・用量] (1) 散：1回 2-2.5g 1日 3回

(2) 湯

[効能・効果] 体力中等度以上で、胸腹部に重苦しさがあり、ときに不安、不眠などがあるものの次の諸症：  
胃炎、胃痛、腹痛、神経症

### 8 2 A 解労散

[成分・分量] 茵薬 4-6、柴胡 4-6、土別甲 2-4、枳実 2-4、甘草 1.5-3、茯苓 2-3、生姜 1 (ヒネショウガを使用する場合 2-3)、大棗 2-3

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度又はやや虚弱で、胸腹部に重苦しさがあり、ときに背中に痛みがあるものの次の諸症：  
慢性の発熱、腹痛、胃痛

### 8 2 B 柴胡疎肝湯

[成分・分量] 柴胡 4-6、芍薬 3-4、枳実 2-3、甘草 2-3、香附子 3-4、川芎 3、青皮 2

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度で、胸腹部に重苦しさがあり、ときに頭痛や肩背がこわばるもの次の諸症：  
腹痛、側胸部痛、神経痛

### 8 3 四逆湯

[成分・分量] 甘草 2-4.8、乾姜 1.5-3.6、加工ブシ 0.3-2.4

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力虚弱あるいは体力が消耗し、手足が冷えるものの次の諸症：  
感冒、急・慢性胃腸炎、下痢、はきけ

### 8 3 A 四逆加人参湯

[成分・分量] 甘草 2-4.8、乾姜 1.5-3.6、加工ブシ 0.5-2.4、人参 1-3

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力虚弱あるいは体力が消耗し、貧血気味で手足が冷えるものの次の諸症：  
感冒、急・慢性胃腸炎、下痢、はきけ、貧血

### 8 4 四君子湯

[成分・分量] 人参 3-4、白朮 3-4 (蒼朮も可)、茯苓 4、甘草 1-2、生姜 0.5-1、大棗 1-2

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力虚弱で、痩せて顔色が悪くて、食欲がなく、疲れやすいものの次の諸症：  
胃腸虚弱、慢性胃炎、胃のもたれ、嘔吐、下痢、夜尿症

### 8 5 滋血潤腸湯

[成分・分量] 当帰 4、地黄 4、桃仁 4、芍薬 3、枳実 2-3、茜草 2-3、大黃 1-3、紅花 1

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以下で、皮膚にうるおいがないものの次の諸症：  
便秘、のぼせ、肩こり

8 6 紫根牡蛎湯

[成分・分量] 当帰 4-5、芍薬 3、川芎 3、大黃 0.5-2、升麻 1-2、牡蠣 3-4、黃耆 2、紫根 3-4、甘草 1-2、忍冬 1.5-2

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以下のもので、消耗性疾患などに伴うものの次の諸症：

乳腺の痛み、痔の痛み、湿疹・皮膚炎、貧血、疲労倦怠

8 7 梶子鼓湯

[成分・分量] 山梔子 1.4-3.2、香豉 2-9.5

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以下で、胸がふさがり苦しく、熱感があるものの次の諸症：

不眠、口内炎、舌炎、咽喉炎、湿疹・皮膚炎

8 8 梶子柏皮湯

[成分・分量] 山梔子 1.5-4.8、甘草 1-2、黃柏 2-4

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度で、冷えはなく、ときにかゆみがあるものの次の諸症：

湿疹・皮膚炎、かゆみ、目の充血

8 9 滋腎通耳湯

[成分・分量] 当帰 2.5-3、川芎 2.5-3、芍薬 2.5-3、知母 2.5-3、地黃 2.5-3、黃柏 2.5-3、白芷 2.5-3、黃芩 2.5-3、柴胡 2.5-3、香附子 2.5-3

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力虚弱なものの次の諸症：

耳鳴り、聴力低下、めまい

9 0 滋腎明目湯

[成分・分量] 当帰 3-4、川芎 3-4、熟地黃 3-4、地黃 3-4、芍薬 3-4、桔梗 1.5-2、人参 1.5-2、山梔子 1.5-2、黃連 1.5-2、白芷 1.5-2、蔓荊子 1.5-2、菊花 1.5-2、甘草 1.5-2、細茶 1.5、燈心草 1-1.5（燈心草のない場合も可）

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力虚弱なものの次の諸症：

目のかすみ、目の疲れ、目の痛み

### 9 1 柿蒂湯

[成分・分量] 丁子 1-1.5、柿蒂 5、ヒネショウガ 4 (生姜を使用する場合 1)

[用法・用量] 湯

[効能・効果] しゃっくり

《備考》 注) 体力に関わらず、使用できる。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
〈効能・効果に関する注意〉として記載する。】

### 9 2 四物湯

[成分・分量] 当帰 3-5、芍薬 3-5、川芎 3-5、地黃 3-5

[用法・用量] (1) 散: 1回 1.5-2g 1日 3回

(2) 湯

[効能・効果] 体力虚弱で、冷え症で皮膚が乾燥、色つやの悪い体质で胃腸障害のないものの次の諸症:

月経不順、月経異常、更年期障害、血の道症<sup>注)</sup>、冷え症、しもやけ、しみ、貧血、産後あるいは流産後の疲労回復

《備考》 注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
〈効能・効果に関する注意〉として記載する。】

### 9 2 A 加味四物湯

[成分・分量] 当帰 2.5-3、川芎 2-3、芍薬 2-3、地黃 3-8、蒼朮 3 (白朮 2.5 も可)、麦門冬 2.5-5、人参 1.5-2.5、牛膝 1-2.5、黃柏 1.5-2.5、五味子 1-1.5、黃連 1.5、知母 1-1.5、杜仲 1.5-2

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力虚弱で、血色がすぐれないものの次の諸症:  
下肢の筋力低下、神経痛、関節の腫れや痛み

### 9 2 B 萎帰膠艾湯

[成分・分量] 川芎 3、甘草 3、艾葉 3、当帰 4-4.5、芍薬 4-4.5、地黃 5-6、阿膠 3

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以下で、冷え症で、出血傾向があり胃腸障害のないものの次の諸症:  
痔出血、貧血、月経異常・月経過多・不正出血、皮下出血

### 9 2 C 七物降下湯

[成分・分量] 当帰 3-5、芍薬 3-5、川芎 3-5、地黃 3-5、釣藤鈎 3-4、黃耆 2-3、黃柏 2

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以下で、顔色が悪くて疲れやすく、胃腸障害のないものの次の諸症:  
高血圧に伴う随伴症状 (のぼせ、肩こり、耳なり、頭重)

9 2 D 当帰飲子

〔成分・分量〕 当帰 5、芍薬 3、川芎 3、蒺藜子 3、防風 3、地黃 4、荊芥 1.5、黃耆 1.5、何首烏 2、甘草 1

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、冷え症で、皮膚が乾燥するものの次の諸症：  
湿疹・皮膚炎（分泌物の少ないもの）、かゆみ

9 3 炙甘草湯

〔成分・分量〕 炙甘草 3-4、生姜 0.8-1（ヒネショウガを使用する場合 3）、桂皮 3、麻子仁 3-4、大棗 3-7.5、人参 2-3、地黃 4-6、麥門冬 5-6、阿膠 2-3

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、疲れやすく、ときに手足のほてりなどがあるものの次の諸症：  
動悸、息切れ、脈のみだれ

9 4 芍薬甘草湯

〔成分・分量〕 芍薬 3-8、甘草 3-8

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症：  
こむらがえり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛

9 4 A 芍薬甘草附子湯

〔成分・分量〕 芍薬 3-10、甘草 3-8、加工ブシ 0.3-1.6

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以下で、冷えを伴うものの次の諸症：  
こむらがえり、筋肉のけいれん、胃痛、腹痛、腰痛、神経痛

9 5 鷓鴣菜湯（三味鷄鴣菜湯）

〔成分・分量〕 海人草 3-5、大黃 1-1.5、甘草 1-2

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 回虫の駆除

《備考》 注）体力に関わらず、使用できる。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
〈効能・効果に関する注意〉として記載する。】

9 6 蛇床子湯

〔成分・分量〕 蛇床子 10、当帰 10、威靈仙 10、苦参 10

〔用法・用量〕 水 1,000mL を加えて濃縮し 700mL とし外用する。

〔効能・効果〕 ただれ、かゆみ、たむし

### 9 7 十全大補湯

[成分・分量] 人参 2.5-3、黄耆 2.5-3、白朮 3-4 (蒼朮も可)、茯苓 3-4、当帰 3-4、芍藥 3、地黃 3-4、川芎 3、桂皮 3、甘草 1-2

[用法・用量] 湯 (原則として)

[効能・効果] 体力虚弱なものの次の諸症：  
病後・術後の体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血

### 9 8 十味敗毒湯

[成分・分量] 柴胡 2.5-3.5、桜皮 (樺樹) 2.5-3.5、桔梗 2.5-3.5、川芎 2.5-3.5、茯苓 2.5-4、獨活 1.5-3、防風 1.5-3.5、甘草 1-2、生姜 1-1.5  
(ヒネショウガを使用する場合 3)、荊芥 1-2、連翹 2-3 (連翹のない場合も可)

[用法・用量] (1) 散 : 1回 1.5-2g 1日 3回  
(2) 湯

[効能・効果] 体力中等度なものの皮膚疾患で、発赤があり、ときに化膿するものの次の諸症：  
化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期、じんましん、湿疹・皮膚炎、水虫

### 9 9 潤腸湯

[成分・分量] 当帰 3-4、熟地黃・乾地黃 各 3-4 (又は地黃 6)、麻子仁 2、桃仁 2、杏仁 2、枳實 0.5-2、黃芩 2、厚朴 2、大黃 1-3、甘草 1-1.5

[用法・用量] (1) 散 : 1回 2-3g 1日 3回  
(2) 湯 : 上記量を 1 日量

[効能・効果] 体力中等度又はやや虚弱で、ときに皮膚乾燥などがあるものの次の症状：  
便秘

### 1 0 0 蒸眼一方

[成分・分量] 白礬 (明礬) 2、甘草 2、黃連 2、黃柏 2、紅花 2

[用法・用量] 各生薬を混合後、水 300mL を加え煎じて 200mL とする。洗眼又は温湿布する。

[効能・効果] ものもらい、ただれ目、はやり目

### 1 0 1 小建中湯

[成分・分量] 桂皮 3-4、生姜 1-1.5 (ヒネショウガを使用する場合 3-4)、大棗 3-4、芍藥 6、甘草 2-3、膠餡 20 (マルツエキス、滋養糖可、水餡の場合 40)

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力虚弱で、疲労しやすく腹痛があり、血色がすぐれず、ときに動悸、手足のほてり、冷え、ねあせ、鼻血、頻尿および多尿などを伴うものの次の諸症：

小児虚弱体質、疲労倦怠、慢性胃腸炎、腹痛、神経質、小児夜尿症、夜泣き

### 101A 黄耆建中湯

[成分・分量] 桂皮 3-4、生姜 1-2 (ヒネショウガを使用する場合 3-4)、大棗 3-4、芍薬 6、甘草 2-3、黄耆 1.5-4、膠飴 20 (膠飴はなくても可)

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力虚弱で、疲労しやすいものの次の諸症：  
虚弱体質、病後の衰弱、ねあせ、湿疹・皮膚炎、皮膚のただれ、腹痛、冷え症

### 101B 帰耆建中湯

[成分・分量] 当帰 3-4、桂皮 3-4、生姜 1-1.5 (ヒネショウガを使用する場合 2-4)、大棗 3-4、芍薬 5-6、甘草 2-3、黄耆 2-4、膠飴 20 (膠飴はなくても可)

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力虚弱で、疲労しやすいものの次の諸症：  
虚弱体質、病後・術後の衰弱、ねあせ、湿疹・皮膚炎、化膿性皮膚疾患

### 101C 当帰建中湯

[成分・分量] 当帰 4、桂皮 3-4、生姜 1-1.5 (ヒネショウガを使用する場合 4)、大棗 3-4、芍薬 5-7.5、甘草 2-2.5、膠飴 20 (膠飴はなくても可)

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力虚弱で、疲労しやすく血色のすぐれないものの次の諸症：  
月経痛、月経困難症、月経不順、腹痛、下腹部痛、腰痛、痔、脱肛の痛み、病後・術後の体力低下

### 102 小柴胡湯

[成分・分量] 柴胡 5-8、半夏 3.5-8、生姜 1-2 (ヒネショウガを使用する場合 3-4)、黃芩 2.5-3、大棗 2.5-3、人参 2.5-3、甘草 1-3

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度で、ときに脇腹（腹）からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振や口の苦味があり、舌に白苔がつくものの次の諸症：  
食欲不振、はきけ、胃炎、胃痛、胃腸虚弱、疲労感、かぜの後期の諸症状

### 102A 柴陷湯

[成分・分量] 柴胡 5-8、半夏 5-8、黃芩 3、大棗 3、人参 2-3、甘草 1.5-3、生姜 1-1.5 (ヒネショウガを使用する場合 3-4)、桔梗仁 3、黃連 1-1.5

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度以上で、ときに脇腹（腹）からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振で口が苦く、舌に白苔がつき、強いせきが出てたんが切れにくく、ときに胸痛があるものの次の諸症：  
せき、胸痛、気管支炎

### 102B 柴蘇飲

[成分・分量] 柴胡 5、半夏 5、黃芩 3、人参 3、大棗 3、香附子 4、蘇葉 1.5-3、甘草 1.5、陳皮 2、生姜 1

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度で、ときに脇腹（腹）からみぞおちあたりにかけて苦しく、やや神經質で氣鬱傾向を認めるものの次の諸症：  
耳鳴り、耳閉感

### 102C 小柴胡湯加桔梗石膏

[成分・分量] 柴胡 7、半夏 5、生姜 1-1.5（ヒネショウガを使用する場合 4）、黃芩 3、大棗 3、人参 3、甘草 2、桔梗 3、石膏 10

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 比較的体力があり、ときに脇腹（腹）からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振や口の苦味があり、舌に白苔がつき、のどがはれて痛むものの次の諸症：  
のどの痛み、扁桃炎、扁桃周囲炎

### 102D 清肌安蛔湯

[成分・分量] 柴胡 6-7、半夏 5-6、生姜 1-1.5（ヒネショウガを使用する場合 3-4）、人参 3、黃芩 3、甘草 2、海人草 3、麦門冬 3

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度で、ときに脇腹（腹）からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振や口の苦味があり、舌に白苔がつくものの次の症状：  
回虫の駆除

### 103 小承気湯

[成分・分量] 大黃 2-4、枳実 2-4、厚朴 2-3

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 比較的体力があり、腹部が張って膨満し、ときに発熱するものの次の症状：  
便秘

### 104 小青竜湯

[成分・分量] 麻黃 2-3.5、芍薬 2-3.5、乾姜 2-3.5、甘草 2-3.5、桂皮 2-3.5、細辛 2-3.5、五味子 1-3、半夏 3-8

[用法・用量] 湯

[効能・効果] 体力中等度又はやや虚弱で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出るものの次の諸症：  
気管支炎、気管支ぜんそく、鼻炎、アレルギー性鼻炎、むくみ、感冒、花粉症

#### 104A 小青竜湯加杏仁石膏（小青竜湯合麻杏甘石湯）

〔成分・分量〕 麻黄 2-4、芍薬 2-3、乾姜 2-3、甘草 2-3、桂皮 2-3、細辛 2-3、五味子 1.5-3、半夏 3-6、杏仁 4、石膏 5-10

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度で、せきが出て、のどの渴きがあるものの次の諸症：  
気管支ぜんそく、小児ぜんそく、せき

#### 104B 小青竜湯加石膏

〔成分・分量〕 麻黄 3、芍薬 3、乾姜 2-3、甘草 2-3、桂皮 3、細辛 2-3、五味子 2-3、半夏 6-8、石膏 2-5

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出て、のどの渴きがあるものの次の諸症：  
気管支炎、気管支ぜんそく、鼻炎、アレルギー性鼻炎、むくみ、感冒

#### 105 椒梅湯

〔成分・分量〕 烏梅 2、山椒 2、檳榔子 2、枳実 2、木香 2、縮砂 2、香附子 2、桂皮 2、川棟子 2、厚朴 2、甘草 2、乾姜 2

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 回虫の駆除

〔備考〕 注) 体力に関わらず、使用できる。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、  
〈効能・効果に関する注意〉として記載する。】

#### 106 小半夏加茯苓湯

〔成分・分量〕 半夏 5-8、ヒネショウガ 5-8 (生姜を用いる場合 1.5-3)、茯苓 3-8

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力に関わらず使用でき、恶心があり、ときに嘔吐するものの次の諸症：

つわり、嘔吐、恶心、胃炎

#### 107 消風散

〔成分・分量〕 当帰 3、知母 1-2、地黃 3、胡麻 1-1.5、石膏 3-5、蟬退 1-1.5、防風 2、苦参 1-1.5、蒼朮 2-3 (白朮も可)、荊芥 1-2、木通 2-5、甘草 1-1.5、牛蒡子 2

〔用法・用量〕 湯

〔効能・効果〕 体力中等度以上人の皮膚疾患で、かゆみが強くて分泌物が多く、ときに局所の熱感があるものの次の諸症：  
湿疹・皮膚炎、じんましん、水虫、あせも